


外臺秘要

[H] Chinese
Vol III

3

v.5-v.8



尚德按
此當作壯

唐王素先生外臺祕要方卷五目錄癰病十

癰瘡方二十一首

五藏及胃瘡方六首

溫瘡方五首

山瘡瘡方一十九首

十二時瘡方一十二首

發作無時瘡方三首

瘡瘡方五首

間日瘡方二首

久瘡方八首

勞瘡方三首

牡瘡方二首

一切瘡方四首

灸瘡法一十三首

瘰癧法六首

許仁則瘡瘡方四首

唐王壽先生外臺祕要方卷五

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程行道敬通父訂梓

男坤音錫錫為為載載父全校

療瘧方二十一首

通按二十
五日一作
二十六日
一作二十
二日
高德接盤
病源作盤

病源夏曰傷暑秋必病瘧瘧病之發以時者此由邪氣客於風府循膂而下衛氣一日一夜常大會於風府其明日下一節故其作也晏此先客於脊背也每至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作此所以曰作稍益晏者也其出於風府日下一節二十五日下至尾骶二十六日入於脊內注於伏膂之脈其氣上行九日出於缺盤之中其氣曰高故作日益早也其間日發者由邪氣內薄於五藏橫連募原其道遠其氣深其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間日蓄積乃作夫衛氣每至於風府則腠理乃發發則邪氣入邪氣入則病作今衛氣日下一節則其氣之發也不當風府其日作者奈何曰此邪氣客於頭項循膂而下者也故虛實不同邪中異所則不得當其風府也故邪中於頭項者氣至頭項而病中於背者氣至背而病中於腰脊者氣至腰脊而病中於手足者氣至手足而病衛氣之所與瘧也相與同類而風獨常在也而瘧得以時休者何也由風氣留其處瘧氣隨經絡沈以內薄故衛氣應乃作陽當陷而不陷陰當升而不升為邪所中陽遇邪則蹙陰遇邪則緊蹙則惡寒緊則為慄寒慄相薄故名曰瘧弱則發熱浮乃汗出旦中旦發晚中晚發夫瘧其人形瘦皮必粟起問曰病瘧以月一日發當以十五日愈設不愈月盡解出第十
一匙中

廣濟療瘧常山散方 常山鉅升麻仁蜀漆 右三味搗篩為散一服二錢匕和井華水煮米半合頓

服少間則吐吐訖則差忌生葱生菜及諸菓子生冷油膩等物

仲効
備康
急瘧
同問
並曰
出或
第一夜
卷發
中者
得

癰瘡若但熱不寒者邪氣在心藏外舍分肉之間令人汗煩肌痛

又辨瘧脉夫瘧脉自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者下之弦弦遲者益善愈弦緊者不可發汗金

又辨瘡歲發至三歲發連日發不解者以脅下有瘡也瘡之不得攻其瘡但虛其津液先其時發汗其

服湯已先小寒者漸引衣自覆汗出小便利則愈瘡者病人形瘦皮上必粟走文仲景無此論

又陷癰瘡以月一日發當以十五日愈言不差者人三觔也女其三分

分三
 草薢二分
 石薢二分
 厚朴三分
 牡丹皮五分
 瞿麥二分
 紫葳三分
 半夏一分
 洗一分
 人參一分
 麝蟲五分
 阿膠三分
 蜂窠

四分赤消_{十二分} 蜣螂_{六分} 桃仁_{三分去}
尖 右二十三味末之取銀竈下土一斗清酒一斛五升浸土候

酒盡一半著整甲於中煮令泛爛如膠漆絞取汁下諸藥煎為丸如梧子大空心服七丸日三服忌食

菜生葱胡荽羊肉錫等物赤清試婦用銀釵一斛
藥用八黃藥三人參三大棗十二甘草三兩生薑五片

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升日三忌海藻菘菜經心解毒

卷中第十五

肝後療諸瘧方 取青蒿一 右一味以水一升漬絞取汁盡服之文神同

又方 鼈甲炙三 右一味搗末酒服方寸匕至發時令服三服華用火炙無不饒老忌葷菜

又方 牛膝莖葉一把 以酒三升漬一宿 分三服 今後有汗 氣不即覺 身不立 三月工驗 同並出

深師瘰癧膈痰不得吐宜吐之常山烏梅湯方 烏梅_{酢桂心_酢羌花_酢豉_五豉_半半夏_雨常山_雨 右六}

味切以酒三升水四升合煮取二升分三服必得吐一方取三升忘生葱羊肉錫生菜_夏常山_雨 右六

又瘰癧丸神方 人參_三鉉丹_三天雄_三分 右三味搗合下篩蜜和初服二丸如梧子臨發服二丸中

當溫熱四肢淫淫痺為知服藥忌飽飯食瘰癧斷後食如常萬不失一_{仲急文}

又瘰癧橡膈湯方 常山_雨三甘草_三雨松蘿_雨二烏梅_雨十四黃芩_雨二瓜蒂_雨十四梔子仁_雨十四 右七味切以

酒二升漬一宿明旦以水四升煮取三升分三服忌海藻生葱生菜等

又瘰結實積熱煩擾迷胃寒熱但多綿愒困篤常山大黃湯方 常山_雨三甘草_雨三前胡_雨二大黃_雨三 右

四味切以水一斗煮取三升半下大黃煮取三升分澄令冷初服七合中服八合比欲發服九合王

州大子因瘰危困服此皆愈忘海藻菰菜生葱生菜等

又瘰癧醇醪湯方 生薑_雨三烏梅_雨三七枚_雨一甘草_雨三兩桂心_雨二常山_雨三藁荷根_雨三 右六味切以水六

升煮取一升曰醇未發時須頓服更以水三升煮取一升曰醪至發不斷復頓服甚良別方說發日平

旦服醪一升以醇著頭邊若欲發便服醇神良二說不同也忘海藻菰菜生葱生菜_{此第二}

千金麻黃湯瘰癧須發汗方 麻黃_去四兩大黃_雨四括蕒_雨四甘草_雨一兩 右四味切以水七升煮取二升半

分三服未發前食項服臨發更服服後皆覆取汗忌海藻菰菜_{此卷中}

千金翼瘰癧病醫不能救者方 以繩量病人脚圍繞足跟及五指一匝訖截斷繩取所量得繩置項上

著反向背上當繩頭處中脊骨上灸三十壯則定候看復惡寒急灸三十壯則定比至過發一炊久候

之雖飢勿與食盡日此神驗男左足女右足_{此卷中}

崔氏瘰癧會稽賴公常山湯方 常山_雨三石膏_雨八兩碎 甘竹葉_切一把糯米_粒一百 右四味切以水八升明

旦欲服今晚漬於銅器中露置星月下高淨處橫刀其上向明取藥於病人房門前於銅器裏緩火煎

取三升分三服日飲出一服臨發又一服若即定不須後服取藥滓石膏裏置心上餘四分置左右手

足心甚驗忘生蔥生菜出第四卷中

備急常山華院桂心丸神良方 甘草炙常山 大黃 桂心各四分 右四味末之蜜和平旦服如兔屎

每欲發服六九飲下之欲服藥時先進少熱粥良忌海藻菰菜生蔥生菜穀仲同出

延年療瘧常山丸方裴石 常山細青木香四分蜀漆一分牡蠣二分大黃一分烏梅肉一分丹砂二分豉二分

無知母二分鼈甲一分麻黃一分右十一味搗篩蜜和為丸如梧子未發前粥飲服五丸訖微吐後須

更任食至欲發更服十九丸忌葷菜生血物生蔥生菜油膩崔氏

又療瘧九方 常山三甘草二分知母四分 右三味搗篩蜜和為丸九如梧子未發前飲服十五丸臨發

服十五丸得快吐則愈忌海藻生菜菰菜並出第五卷中

必効瘧瘧雞子常山丸方 取雞子一枚斷開頭出黃及白令盡置小鑊子中又取常山細末量滿前空

殼又傾鑊子中又量白蜜還令滿般復傾鑊子中三味同攪微火煎之勿停手微冷可丸則停丸如梧

子如病人午時發已時服三十九丸欲至發時又服三十九丸用飲汁下欲吐任吐亦如前服訖更不發者

不須服服後禁脂膩油麤生菜瓜果七日此方勅賜喬將軍服之立效小品崔氏文仲延年史家備急並同

又療瘧不差虎骨常山丸方 虎頭骨炙常山 甘草炙鼈甲炙烏梅熟姜蕤白薇 升麻 茯苓

石膏研知母 麥門冬去心豆豉炙地骨白皮 右十四味各等分合搗蜜和丸如梧子大未發前日晚

空肚服二十九至發日平旦服四十九如人行十里食白粥一椀欲發時亦服三十九三日內慎生冷

萬無一觸不吐自差魏右史處得云奇效忌海藻菰菜大酢生蔥生菜菰菜

又療瘧常山酒方 常山切獨頭蒜一頭去根糯米粒一百 烏豆粒一百 清酒一升右五味病未發前一日

以酒浸藥於甕中以白紙一張覆之甕上橫一刀欲發時三分飲一分如未吐更服一分得吐則差忌

生菜生葱並出第一卷中

而德按並
出字疑脫

通接升麻
又一作烏
扇

古今錄驗療瘧鼓心丸方

香鼓五合常山二附子二分

右四味搗篩蜜和丸服如大豆十

丸當勿食比至發來令服三十九丸瘧不止亦可至四十九丸瘧必止若膈上有停痰欲吐聽之若腹中實欲下亦無妨常有驗忘生蔥生菜等楊孔惠方出

又烏梅丸瘧瘧無問溫瘧瘧瘧悉皆主之方

烏梅肉二常山二鼈甲二香鼓二蜀漆二人參二肉

蓯蓉二桂心二知母二桃仁二兩二去皮共

右十味搗篩為末蜜和丸如桐子空心以酒飲任下三十

丸忘生蔥生菜蓯蓉海藻菰菜各二兩為十二味

五臟及胃瘧方六首

病源肺病為瘧者乍來乍去令人心寒寒甚則熱發善驚如有所見此肺瘧證也若人本來語聲清雄忽爾不亮拖氣用力方得出言而反於常人呼共語直視不應雖曰未病勢當不久此則肺病聲之候也察病觀疾表裏相應依源審療乃不失也

心病為瘧者令人心煩其欲飲清水多寒少熱若人本來心性和雅而忽卒反於常倫或言未訖便住以手剔脚爪此人必死禍雖未及呼曰行尸此心病聲之候也虛則補之實則瀉之不可療者明而察之肝病為瘧者令入色蒼蒼然氣息喘悶戰掉狀如死者若人本來少於悲恚忽爾嗔怒出言反常乍寬乍急言未訖以手向眼如有所思若不即病禍必至矣此肝病聲之候也其人若虛則為寒風所傷若實則熱氣所損陽則瀉之陰則補之

脾病為瘧者令人寒則腹中痛熱則腸中鳴鳴已則汗出若其人本來少於喜怒而忽反常嗔喜無度多言自笑不答於人此是脾病聲之候也不盈旬日禍必至矣

腎病為瘧者令人悽悽然腰脊痛而宛轉大便澀身掉不定暗問然手足寒若人本來不喜不怒忽然審而好瞋怒反於常性此腎已傷雖未發覺是其候也見人未言而前開口笑還閉口不聲舉手介柵腹此腎病聲之候也虛實表裏浮沉清濁宜以察之遂以療之

外臺祕要

卷五

五臟及胃瘧方六首

三

夫瘧脈者自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者可下之弦遲者溫藥已若脈數而緊者可發汗針灸之脈浮大者不可針灸之凡瘧先發食頃乃可以療之過之則失時

足太陽之瘧令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱燭燭燭燭喝喝然熱止汗出難已刺却中出血

足少陽之瘧令人身體解休寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽

足陽明之瘧令人先寒洒洒漸寒甚久乃熱熱去汗出喜見日月火光火氣乃快然刺足陽明膺上

足太陰之瘧令人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出病至則嘔嘔已乃哀則取之

足少陰之瘧令人悶吐嘔甚多寒熱熱多寒少欲閉戶而處其病難止

足厥陰之瘧令人腰痛少腹滿小便不利如瘧狀非瘧也數小便意恐懼氣不足腹中悒悒刺足厥陰

肺瘧者令人心寒寒甚發熱熱間善驚如有所見者刺手太陰陽明

心瘧者令人煩心甚欲得清水反寒多不甚熱刺手少陰

肝瘧者令人色蒼蒼然太息其狀若死者刺足厥陰見血

脾瘧者令人病寒則腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出刺足太陰

腎瘧者令人洒洒腰痛骨痛宛轉大便難目眴眴然手足寒刺足太陽少陰

胃瘧者令人且病也善飢而不能食食即支滿腹大刺足陽明太陰橫脉出血並出第十卷中

千金瘧肝邪熱為瘧顏色蒼蒼戰掉氣喘或熱久勞動如瘧積年不差烏梅丸方烏梅肉四分蜀漆分石

膏八分鼈甲四分常山六分香鼓一合知母四分甘草三分細辛三分苦參四分姜蕤五分右十一味搗師蜜和

如梧子大酒服十九日再飲下亦得忘覓菜生菜生蔥海藻菰菜

又瘧心瘧令人煩心甚欲得清水多寒少熱者常山湯方 常山兩淡竹葉切二梔子仁三枚石膏五兩東烏梅三枚鼈甲四兩甘草一兩香鼓一升蜀漆兩三右九味以水九升煮取三升分溫三服忌生蔥生茱菰菜人苧海藻同禁

尚德按千金養一

尚德按千金養一

尚德按千
金林米三
百一十粒

又療脾熱或渴或不渴熱氣內傷不轉為脾瘧令人病寒則腹中痛熱則腸中鳴轉汗出常山丸方

常山兩三甘草半兩知母一兩薑一分右四味搗篩蜜和丸如梧子大未發前酒服十九丸臨服又服

正發又服一服忘生蔥生菜海藻菰菜人苋等

又療肺熱痰聚胸中來去不定轉為瘧其狀令人心寒甚即發熱熱間善驚如有所見常山湯方 常山

兩三林米三百甘草二分右三味切以水七升煮取三升分三服至發時令三服盡忘生蔥生菜海藻

菰菜等同藥

又療腎熱發為瘧令人悽悽然腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒常山湯方 常山兩三烏梅三

枚八合淡竹葉切一葱白一握除青令盡右五味切以水九升煮取三升去滓分溫三服至發令盡忘生蔥

生菜等並出第十卷中

刪繁療胃脘瘧者令人善飢而不能食四肢脹滿氣喘鬱蘆丸方 蘆蘆一兩皂莢一兩去皮子常山一兩巴豆三

枚去半膝一右五味熬蘆蘆皂莢色令黃合搗為末蜜丸如小豆旦服一九未發前一丸正發一九

一日勿食飲忌野猪肉蘆蘆生蔥生菜狸肉等六兩唯胃有蘆不可別列故附於後千金同出第六卷中

溫瘧方五首

病源夫溫瘧與寒瘧安舍溫瘧得之冬中於風寒寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能出因

遇大暑腦髓錄肌肉消釋腠理發泄因有所用力邪氣與汗偕出此邪氣先藏於腎其氣先從內出之於

外如是則陰虛而陽盛盛則病矣陽衰則氣復反入入則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧瘧

先寒而後熱者此由夏傷於大暑汗大出腠理開發因遇夏氣淒淒之小寒寒迫之藏於腠理皮膚中秋

傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱病以時作名曰寒

瘧先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒亦以時作名曰溫瘧夫病瘧六七日但見熱者溫瘧也一士中

甲乙經黃帝曰夫瘧皆生於風夏傷於暑秋為瘧瘧

尚德按先
施千金同
注誤
尚德按甲
乙經病作
之陽字

黃帝問瘧先寒而後熱何也岐伯對曰夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也名曰寒瘧

又問曰先熱而後寒者何也對曰先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒也名曰溫瘧其但熱而不寒者陰氣先傷於陽氣獨發即少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘧

又曰溫瘧者得之冬中於風寒寒氣藏於骨髓之中至春即陽氣大發邪氣不能出因遇大暑腦髓無肌肉消釋腠理發洩因有所用力邪氣與汗偕出此邪氣先藏於腎其氣先從內出之於外如是者陰虛而陽盛盛則病矣陽衰則氣復反入入則陽虛陽虛則復寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧

又曰瘧瘧者肺素有熱氣盛於身厥氣逆上中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒金於皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣不及於陰故但熱不寒熱氣內藏於心外舍分肉之間令人銷鑠脫肉故名曰瘧瘧出庚基第十金同

廣濟療溫瘧漸漸羸瘦欲成骨蒸常山湯方 常山三兩車前葉二兩甘草二兩獼猴骨三兩烏梅肉二兩天靈

蓋一作兩燒末驢糞汁二合 右七味切以水六升煮五味取三升去滓下糞汁天靈蓋末分三服微吐不利

忌生蔥生菜海藻菰菜麴粘食等

又療溫瘧常山丸方 常山 烏梅肉煮 豉 天靈蓋六分 知母 硃砂 蜀漆 大黃各四 右

八味搗篩蜜和丸如梧子空肚以溫酒下二十九至三十九日三服並未發前服不吐利忘生蔥生菜

生血等物並出第十卷中

千金論曰瘧瘧者陰氣孤絕陽氣獨發其候也少氣煩滿手足熱欲嘔熱而不寒氣藏在心

又曰有溫瘧者其脉如平人無寒時熱其候骨節疼痛時嘔朝發暮解暮發朝解皆白虎加桂心湯主之

方 知母二兩甘草二兩石膏一斤粳米六合 右四味切以水一斗二升煮取米爛去滓加桂心三兩煎取三

升分溫三服覆令汗先寒後熱汗出者愈忌海藻菰菜生蔥傷寒論云用粳米不熟稻米是也出第十卷

尚德按六
合要略作
二合
又按仲景
無用粳米
米云云

備急竹葉常山湯療溫瘧壯熱微寒溫瘧之候也壯熱後如覺微寒或瘧瘧依時手足冷少時便壯熱亦

有手足煩熱乾嘔者瘧瘧先大寒後大熱者並主之神效尤宜乳下小兒亦差方 常山三兩 淡竹葉一握

小麥升 右三味以水五升漬一宿明旦煮取二升溫分三服忌生菜葱支小品文仲並同出第三卷中

延年療溫瘧壯熱不能食知母薑甲湯方 知母 薑甲天 地骨皮兩 常山二兩 竹葉升 石膏四兩

右六味切以水七升煮取二升五合去滓三服忌蒜猪肉苺菜生葱生菜出第十卷中

山瘧瘧方一十九首

病源此病生於嶺南帶山瘧之氣也其狀發寒熱休作有時皆由挾溪源嶺瘧溫毒氣故也其病重於傷

者之瘧矣出第十卷中

小品療山瘧瘧陵鯉甲湯南方山嶺溪源瘧氣毒作寒熱發作無時痿黃腫滿四肢痺弱皆山毒所為也

並主之方 陵鯉甲十片炙干 金烏賊魚骨炙 鼈甲炙 常山三兩 附子一枚 右五味切以酒三升漬之一

夕先瘧發前稍稍服之勿絕藥味兼以塗身體斷雜人勿食飲過時乃得通人進飲食忌苺菜生葱生

菜諸肉千金文仲備急經心并同出第六卷中

千金療乍寒乍熱有乍無山瘧瘧酒方 常山三兩 薑甲炙 升麻 附子 烏賊魚骨炙 右五味並

切絹袋盛以酒六升漬之小令近火轉之一宿成一服一合比發可數服或吐忌豬肉生葱生菜苺菜

附後療老瘧久不

備急夫瘧與瘧分作兩名其實一致或先寒後熱或先熱後寒嶺南率稱為瘧江北總號為瘧此由方言

不同非是別有異病然南方溫毒此病尤甚原其所歸大略有四一山溪毒氣二風溫瘧飲三加之鬼竊

四發以熱毒在此之中熱毒最重故所用藥物須審病源患瘧瘧之後特須防瘧而發痢死不旋踵所以

然者瘧體先虛虛不宜痢人瘧宜冷差則宜溫斷痢則益瘧斷瘧則益痢大率如此不可不慎非直藥

瘧亦須宜加將息取適若能一色藥兼二種病冷而止痢溫而斷瘧最其妙也如不然先須斷痢然後瘧瘧瘧瘧緩痢急故也仍率須作挾毒防之不得專醫其痢又服瘧藥皆在發前必須平旦空腹服藥之時後勿洗手面漱口勿通外人勿與食勿勞力既過發時久小進糜粥如此將瘧無不即斷又當發熱之時慎勿多飲冷水及多服冷藥若心下冷結更是難瘳得瘧之後復成瘕癖亦有即發氣者死不救若熱渴者鼓汁暖服取足得吐彌善水煮鼓所厚汁與服兼時進生葛根汁其大熱盛者與紫雪如雨裏許大水

和飲之并燒猪糞人糞作黃龍湯亦善各可服三二升又搗一大鼠絞汁與服大止熱毒瘧熱病服此俱效其氣并通皮五臟等全傳若汁少者少許水和服亦不難服常用立驗也

又瘧瘧瘧瘧服藥後灸法 灸大椎三四十壯無不斷若先寒者將欲寒預前以炭火安牀下令背煖并灸

臑甲末一方寸匕煖酒和服至發時令得三服被覆過時無不斷此是陶氏法比發寒時但以火炙其背亦乃即差者縱發亦輕效驗

又瘧瘧瘧瘧常山丸方 常山 黃連 鼓子三附子二兩 右四味搗篩為末蜜和丸如梧子發前空腹服四九欲發更服三九飲下之自旦至暮乃食三日勿雜食豬肉魚肥膩及生冷生薑生菜杜仲川芎

服此方藥 瘧者差

又麻黃散方 麻黃去根 常山 杏仁去皮尖 人參 乾漆熬 甘草炙 鼈甲各二兩 右七味作散平旦空腹溫酒三合服方寸匕日再宜七日連服服後七日不得食雜物此許仁則五方元比部云在嶺南服得力

大驗年時常服一副按此兼補虛羸者忌食菜生蔥生菜海藻菰菜

又苦患瘧熱實兼吐痢者大黃湯方 大黃 常山 升麻 甘草各三兩 右四味切以水七升煮取二

升半分三服發前盡服別取吐利此將家傳忌海藻菰菜生蔥生菜

又若瘧熱兼痢苦渴者烏梅飲方 烏梅二十枚 右一味以水一大升煮取一大盞去梅和一匙蜜

細細嗽之近方驗二卷中

直按指當
是古方之
每用之

延年固本丸主癰疽瘰癧發年熱年寒積勞似癰皆主之千金翼方云兼主瘰癧連年不差方蜀漆

知母升麻白薇地骨皮麥門冬五烏梅肉鼈甲炙菱莖絡四石膏甘草常山六分

豆豉一合右十三味搗篩為末蜜和丸如梧子大飲下十丸日再服加至二十丸此方用無不差加

光明砂一兩神良忌海藻蘇菜人莧生慈生菜集千金翼方卷十七

救急瘰癧瘰癧百白或一年以上諸藥不能差違此方無不損者蜀漆湯方白薇蜀漆知母

甘草又苦參升麻龍膽而常山大黃調下鼈甲炙石膏碎茯苓黃芩香豉裏合

獨蒜地淡竹葉升切右十六味切以水一斗清之并春酒二斗合煮取三升去滓分三服未發前

一服欲至發時又一服皆溫之當發日勿見人在一靜房外藥滓置病兒頭邊仍以藥汁塗手而過時

任出忌肥膩腥滑物生令海藥人莧大酢菰菜生慈生菜

又珠砂丸方珠砂硃明牛膝常山等右三味搗篩為末蜜和丸如梧桐子候瘰癧發日平明服七

丸飲下欲覺發時更服七丸當日不斷更作一服即差忌生慈生菜生血物油膩牛肉等

又初腸長孫祥極效常山湯方常山分橘皮壯桂心江右四味搗篩為散發日平旦酒服

一方寸匕臨發又一匕發後又一匕二日不得洗手面七日忌食雜物唯藥用酒餘皆斷或吐或不吐

皆差忌生慈生菜

又方取五六歲兒小便一升內白蜜二大匙攪使相得去白沫訖即頓服當大吐碧綠痰然後食若不

得吐但數小便亦佳以前兩方吐碧痰外更吐白沫出後可喫食不致瘰癧氣終不除

又常山湯方常山苗一握無苗獨蒜淡竹葉鼈甲炙合鼈甲右五味切以苦酒三升煎

取一升臨發隨性多少服之盡服之訖當大吐便愈忌人莧生慈生菜

古今錄驗瘰癧及瘰癧常山湯方常山切右一味搗碎虛弱者二兩蒜七瓣去皮中切以酒一小

升半清一宿旦去滓燉服盡須更當吐令盡好過時食一日不得漱口及洗手面三七日慎生慈生菜

本草卷之六 卷之六 山金匱方卷之六

生冷肉凝油膩若早發者半夜服要令吐十二時瘧方十二首

近效瘧瘧益補闕南柯來恒飲常山丸方常山 鼓蕪桃仁蘇等攷 右三味各搗末先以鼓和

桃仁搗如泥然後下常山末細攪蜜丸如梧桐子候欲發前一食時酒下四十丸須臾更服二十丸如

不差更服遠不過三服能信用者無不差忌生葱生菜

又八鼓涉江山防諸瘧癘及蠱毒等常服木香犀角丸方 青木香 犀角屑 羚羊角諸銘升麻 玄參

諸苓 檳榔銘升 鼈甲炙甘草 八分分 右十味搗篩為末蜜和丸如梧子酒飲服三十丸日二

服若體熱即去甘草檳榔加大黃二十分忌海藻菴菜

又主瘧兼痢無問赤白水穀鮮血瘧皆差黃連犀角丸方 黃連 犀角屑 香豉蘇各 龍骨四 牡蠣二分

右五味搗篩為末蜜和丸如梧子米飲下三十九日三服差止忌豬肉冷水油膩等

又瘧瘧不差蜀漆丸方 蜀漆 青木香 升麻 鼈甲炙牡蠣 蘇砂 諸苓 香豉銘 四常山 大

黃洛八 右十味搗篩為末蜜和為丸如梧子米湯下十二丸日二服漸漸差至平復止忌人葷油膩

陳臭生血等物

十二時瘧方一十二首

千金翼黃帝問岐伯曰瘧多方少愈者何岐伯答曰瘧有十二種帝曰瘧鬼字何可得聞乎岐伯曰但得

瘧鬼字便愈不得其字省方不愈黃帝曰瘧鬼者十二時頗聞之岐伯曰

寅時發者獄死鬼所為瘧之 右以瘧人著罌上灰火一周莫令火即差

卯時發者鞭死鬼所為瘧之 右用五色衣燒作灰三指撮著酒中無酒用清清水服之

辰時發者墮木死鬼所為瘧之 右令瘧人上木高危處以棘子塞木根間立差

巳時發者燒死鬼所為瘧之 右令瘧人坐師以周曲然火差

午時發者鐵死鬼所為瘧之 右令瘧人持脂火於田中無人處燒脂香假拾薪去即差

尚德按各
千金翼作
對下兩岐
伯下皆有
對字
又按大字
下千金翼
有減字

未時發者弱死鬼所為瘡之 右令瘡人臨發時三渡東流水即差

申時發者自刺死鬼所為瘡之 右令瘡人欲發時以刀刺塚上使得姓名字呪曰若差我與汝拔却

即差

酉時發者以婢死鬼所為瘡之 右令瘡人確梢上掛上卧莫令人道姓字即差

戌時發者自絞死鬼所為瘡之 右令索繩繫其手脚腰頭即差

亥時發者盜死鬼所為瘡之 右以刀子一口箭一枝灰一周刀安瘡人腹上其箭橫著底下差

子時發者寡婦死鬼所為瘡之 右令瘡人脱衣束廟床上卧左手持刀右手持杖打令聲不絕瓦盤

盛水著路邊即差

丑時發者斬死鬼所為瘡之 右令瘡人當戶前卧頭東向血流頭下即差 並出第十卷中

發作無時瘡方二首

病源夫衛氣者陽氣也一日一夜大會於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作當其時陰陽

相并隨其所勝則生寒熱故動作皆有早晏若府藏受邪內外失守邪氣妄行所以休作無時也 出第十卷中

肘後瘡瘡發作無常心下煩熱者常山湯方 常山 甘草 白朮 乾薑 附子 黃芩 芍藥 茯苓 桂枝 白朮 甘草 白朮 乾薑 附子 黃芩 芍藥 茯苓 桂枝

取二升再服當快吐仍節飲食忌海藻菘菜生葱生菜 文仲 右三味切以水六升煎去滓

又雞子常山丸瘡諸瘡並經脈諸藥法術不斷發無復定時不可復斷者宜服此丸忌食物勿勞力即斷

方 常山 明三 右一味搗篩為散以雞子白和併手為丸如梧桐子大令圓調丸訖分置銅鑊子中以湯

煮銅鑊令熱殺得雞子腥氣即止以竹葉清飲服三十丸欲吐但吐比至發時令得三服時早可食者

斷若晚不可斷食者當作竹葉汁糜食之忌生葱生菜 經心錄同並出第一卷中

瘡瘡方五首 病源夫瘡瘡者夏傷於暑也其病秋則寒甚冬則寒輕春則應風夏則多汗然其畜作有時以瘡之始發

尚德按
病原作
下同

尚德按
病原作
榮

先起於毫毛伸欠乃作寒慄或頸腰骨俱痛寒去則外內皆熱頭痛而渴唯欲冷飲何氣使然此陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽並於陰則陰實而陽明虛陽明虛則寒慄或頸太陽虛則腰背項痛三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱外內皆熱則喘而渴故欲冷飲也此皆得之夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此營氣之所舍也此令人汗出空疏腠理開因得秋氣汗出遇風乃得之及得以浴水氣舍於皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝日行陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是以日作其間日作者謂其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作一作十

小品常山湯療痲瘧先寒戰動地寒解壯熱日日發及間日發並斷方 斃甲一作雨 沒竹葉切三 常山雨

甘草雨 久酒升三 右五味切以酒漬藥力置上覆頭安露地明旦以水七升煮取三升分五服比未發前令盡當吐止極傷多不必盡劑但斷人禁飲食得吐過時乃佳忘人覓海藻菰菜生葱生菜出第

中

集驗夫瘧必從四肢始療方 先其時一食頃用細左索繩繫束其手足十指過發時乃解之千金

又方 先作羊肉臠餅飽食之其進少酒隨所能令其飲欣有酒氣入一密室裏然炭火厚覆取大汗則差燕國公說此方常見用有驗並出第卷二卷中方士弱

又療溫瘧勞瘧烏梅飲子方 烏梅口虛者得改實者彌甚 桃柳心各七 蔥白七 豉七 豆豉七 甘草 柴胡 知母各四 大黃分三

右八味各細判以童子小便兩茶碗宿浸明旦早煎三兩沸去滓頓服差未差更作服三服永差忌海

藻菰菜

又療溫瘧瘧久不差黃連散方 宣州黃連二 右一味持節末以濃酒一盞調三錢空心頓服相次

更服三錢更飲三兩盞酒任意醉却睡候過時方得食如渴枳實煎湯併三日服差忌豬肉冷水

間日瘧方二首

尚德按
是後者
醇是前
者二句
是注文

尚德按
二十七
金作二

病源此由邪氣與衛氣俱行於六腑而有時相失不相得故邪氣內薄五藏則道遠氣深故其行遲不能與衛氣偕出是以間日而作也

備急療間日瘧方 燒黑牛尾作灰酒服方寸匕日三服

又桂枝湯法醇醪湯方 大黃甘草常山各半 右三味以水三升煮取一升去滓更以水二升煮

滓取一升未發服醪醪是後煮者相次服醇醪是前煮者差忌菰菜海藻生葱生菜等

久瘧方八首

病源夫瘧皆由傷暑及傷風所為熱感之時發汗吐下過度腑藏空虛榮衛傷損邪氣伏藏所以引日不

差仍故休作也瘧歲歲發至三歲發連日發不解脅下有痞瘵之不得攻其痞但得虛其津液先其時發

其汗服湯已先寒引衣自覆汗出小便自利則愈也

深師療久瘧難斷香豉丸方 香豉一分常山鈹蜀漆各一分附子一分 大黃二分 右五味擣下篩蜜和發

日早服五丸如梧子須臾又服五丸發晚者至發可三四服令其得吐為佳欲不即斷畏吐者但則長

將久服無不差也忌生葱生菜猪肉

又療三十年瘧常山湯方 常山 黃連各三 右二味切以酒一斗宿漬之向晚以瓦釜煮取六升一

服八合比發時令得三服有熱當吐有冷當下服之者千百無一不愈亦可半合無服全劑者忌踏肉

冷水生葱生菜

十金梔子湯主瘧經數年不差者兩劑差一月以來一劑差方 梔子十四常山兩車前葉二十枚 林朱

枳四 右四味切以水九升煮取三升分三服未發一服發時一服發後一服以吐利四五行為差不

止冷飲止之忌生葱生菜

崔氏療瘧縱久患者不過五六服以來亦差常山散方 常山三兩乾漆三兩 牡蠣半斤桂心三兩橘皮二

杏仁二兩

右六味搗篩為散一服方寸匕先發熱飲和服若先寒清酒和服之時取未發前一食

頃服服藥日唯須晚食七日內慎如藥法忌生蔥生菜出第四

備急龍骨丸療久瘧不愈者方 龍骨一兩常山三兩黃芩二兩附子一分 右四味搗末以鷄子黃丸如梧子

先發臨發各飲服五丸無不斷長將服之支云神驗療三十年瘧忘生蔥生菜豬肉等張文仲方同

備急療瘧連綿積日不差常山散方 常山 羚羊角一分 烏梅肉三兩 黃芩二兩 甘草半兩 右五味搗

為散以竹葉煮取六七合飲及熱用調常山散三方寸匕未發前一服若差停不差臨欲發又進二寸

匕老小以意量之忌海藻菰菜生蔥生菜

又療瘧無問年月遠近並差烏梅丸方 烏梅肉三兩 薤白二兩 桃仁一兩 常山三兩 升麻二兩 桂心二兩

右七味搗篩蜜和丸如梧子大未發時酒服二十九丸欲至發時更服二十九丸百無所忌唯觸之則

難差飲服亦得此藥或吐利或不吐利勿怪五六日頻進佳忌海藻菰菜生蔥生菜文仲方有連三兩熱

第一

近改療久難差瘧常山酒方 常山三兩 鱖魚骨一兩 烏梅肉七枚 桃仁四十九枚 去

泥竹葉一兩 一鼓三合 蔥白一兩 右九味細切合以酒三升清經再宿空腹早朝溫服一合良久取

吐如不吐至齋午以來服之四服如不差隔日更依前服必差差後十日內不得喫冷水粘滑人覓生

茶餘如常是藥

勞瘧方三首

病源凡瘧積久不差者則表裏俱虛客邪未散真氣不復故疾雖暫久小勞便發也出第一

肘後療勞瘧鼈甲酒方 鼈甲二兩 常山三兩 蜀漆二兩 烏賊魚骨一兩 附子一兩 一知母二兩 右七味切

以酒三斗漬一宿平旦服一合稍稍加至二合日三四服忌蔥菜生蔥生菜豬肉並出第一

千金勞瘧積久不斷眾療無效此方療之 長生大牛膝一虎口切以水六升煮取二升分再服第一服

高德按要
此處多寒
者名北瘧
外症似瘧
又按要略
無此方
高德按十
金名蜀漆
散用蜀漆
不用蜀漆
又按方從
用千金文
按字下十
金有兩字

高德按
此處多寒
者名北瘧
外症似瘧
又按要略
無此方
高德按十
金名蜀漆
散用蜀漆
不用蜀漆
又按方從
用千金文
按字下十
金有兩字

取未發前一食頃服第二服臨發服

服文仲射後同
出第十卷中

集驗瘧一切瘧勞瘧無問年月深遠阿魏散及丸方

阿魏 安息香 蘿蔔子 略二莖薏苡 右四味

搗篩為散以煖水服半錢如不能散服蜜丸熟水下三十九須臾吐忌冷水如吐不止喫蒜薤餅仍

以貼子盛散一錢男左女右繫臂上立差

出第三
卷中

北瘧方二首

仲景傷寒論北瘧多寒者名北瘧牡蠣湯主之方

北瘧 蘇麻黃 各四兩 甘草 炙 蜀漆 各三兩 若無

四味切以水先洗蜀漆三遍去腥以水八升煮蜀漆及麻黃去沫取六升內二味更煎取二升去滓溫

服一升即吐勿更服則愈忘海藥菴案

又瘧北瘧蜀漆散方

蜀漆洗去雲母

龍骨

右三味等分搗篩為散先未發前一炊以清酢漿水和

半錢服臨發時更服一錢溫瘧者加蜀漆半分雲母炭火燒之三日三夜用

雲母一作雲實並
出第十五卷中

一切瘧方四首

崔氏瘧一切瘧大黃丸方

大黃

三兩 朴硝 二兩 巴豆 一分

右三味搗篩大黃朴硝然後內巴豆以

蜜和搗二千杵丸如梧桐子大米飲下兩丸日二服不盡再服即差忌蘆薈野豬肉等物

救急瘧一切瘧常山湯方

常山

三兩 石膏 八兩 白林米 一升

右四味以水八升漬一宿

煮取二升五合去滓分溫三服清旦一服欲發一服正發時一服三服訖靜室中臥莫共人語過時後

洗手面與食七日禁勞生蔥生菜酒及熱麵毒魚久瘧不過再劑一方加烏梅二七枚熬之

集驗瘧
出第一卷中

古今錄驗瘧一切瘧大有驗硃砂丸方

硃砂

一兩 蜀常山 兩三 右二味各搗下篩畢別取硃砂瓷器中細

研可一日研如麵白蜜和重兒搗一萬七千杵訖作丸如梧子大一服三丸用清酒下行五十餘步隨

意坐臥無酒湯下亦得唯須暖將息病人氣力強仍不廢行動者則須於當發日服之如似日西發者

臨發之日勿食平旦服三九已時服三九午後更服三九則差若不差必定輕微更服則差餘時發者
 準此日西一時任意消息其病人氣力微弱者不得臨發日服應預前一日服之如似明日發者今日
 平旦空腹服三九至齋時食一椀粥至日西更服三九至日暮復食一椀淡粥並不得飽食至一更盡
 更服三九至平時食粥一椀至齋前更進三九不得食至午時更進三九必差差後三日以來唯得食
 甜粥飲漿忌生冷酢滑膩麪及飽食七日以來特忌生血物生薑生菜若後七日餘者漸食生冷二種
 須復日禁若如百日來患差後還須百日禁忌生冷乃至七日患者左還復禁七日生冷患來雖經多
 年但得百日以來禁生冷過百日後得食無妨若不禁者必還重發患來日久極重者不過十服差近
 者三五服則差病人十五以上者一服三九十五以下七歲以上者一服兩九七歲以下者一服一九
 如小者分此一九九作二小九服之中第四

近致加減療一切癰無不效比用不過再服八口如神萬不一失桃仁常山丸方 桃仁二兩不熟亦不

常山二兩豆豉三

右三味各別搗五六百杵又和更搗六七百杵然後煎好酒如黑泥自成丸不飲酒

事須酒下三十丸如梧子未發前服臨發更服三十丸以手捧之於鼻下嗅取氣便定如不得平復更
 服三十丸或吐或微利勿怪亦有不利差者吐了仍不得漱口亦不得喫生薑生菜菓子甜物油膩
 等却發則難差此來者不過再三服便差一服差者多其常山須蜀者始堪使用桃仁須是毛桃仁餘
 者即無效豉須新美不用陳者渴者取烏梅三枚作漿稍稍咽三五咽其藥唯一人患則少合不堪預
 合無力不效今方有常山一兩桃仁五七枚豉一合恬多者佳檮常山作散訖次研桃仁作泥別搗豉
 點酒時三五百杵次一處和搗又六百杵以來如法服之舊人更佐

灸瘧法一十三首

千金瘧瘧灸法 灸上星及大椎大椎穴在背從第一至發時令滿一百壯艾炷如黍粒俗人不解取穴

務大炷

尚後按此
 疑當作比
 又按情疑
 當作粘

又法 覺小異則灸百會七壯若後更發灸七壯極難愈者不過三灸

又法 以足踹地以繩圍足一匝中折從大椎向百會灸絛頭三七壯娃如小豆許大

又法 灸風池二穴各三壯

又法 從手發者灸三間穴在虎口第二指節下一寸三年瘕瘕發慘慘則下火

又法 從頭項發者未發前預灸項大椎共頭漸灸過時止

又法 從腰發者灸腎俞百壯穴在第十四椎下兩餘各一寸半是

又法 一切瘕無問遠近法 正仰臥以絛重兩乳間中屈從乳向下灸度項隨年壯男左女右灸

又法 五藏瘕及一切諸瘕法 灸尺澤七壯穴在肘中筋動處是也

又法 瘕瘕瘕法 上星主之穴在鼻中央直入髮際一寸陷容豆是也灸七壯

又法 瘕瘕日西而發者法 臨泣主之穴在目骨上入髮際五分陷者中是也灸七壯

又法 瘕瘕多汗腰痛不能使仰目如脫項如拔者法 崑崙主之穴在足外踝後跟骨上陷中是也灸三壯

又法 瘕瘕實則腰背痛虛則鼻衄法 飛揚主之穴在外上七寸五分是也灸七壯並出第十卷中

襍瘕法六首 千金瘕瘕法 未發前抱大雄雞一隻著懷中時時驚動令雞懷中作大聲無不差肘後同出第十卷中

崔氏書瘕法 平旦日未出時閉氣書之先書額上則戴九天次書兩手心作把九江又書背上從右脾

骨下向左分作兩行書之一如後法南山有一木木下不流水水中有一魚三頭九尾不食五穀唯噉

瘕鬼急急如律令

又書兩脚心下作履九江 右以前法既不損人又無不差者其有一度書不甚差可更書之書符必

不得脫踏亦不可重點畫不成也又勿食五年書瘕法諸州諸上人傳云妙不可說以下二法全用俱發

又法 令所患人未發前正南北眠頭向南五心并額及舌上七處閉氣書鬼字則差隨意任東西肘後

又法 總書八行其下七行一準前行通而為八山題子山題子山題子山題子準前計更有七行通前
為八行此符厭瘧鬼一去千里外急急如律令某年某月某州某縣某鄉某里姓名牒姓名則所惠人
也右以手把符勿開男左女右待過時久然後任開其符仍以火燒却

呪瘧法

候病者發日日出時自執一石於水濱一氣呪云臂臂團團行路非難捉取瘧鬼送與河官

急急如律令即投石沉於水中勿反顧而去

並出第
四卷中

元布聲侍郎集驗書瘧法

額上書兩金字重胸前書兩大字並背上書兩水字並兩手書木字單兩足

下各書王字齊下作四口字重右含水閉氣用朱書未發前書之有驗

許仁則療瘧方四首

許仁則此病之候乃有數種亦有宿患症癖飲食失宜因節氣初交亦生此病亦有痰癖積聚久不通散
冷熱相攻亦生此疾亦有地居卑濕時屬暑熱內有宿病外感惡氣亦生此疾亦有盛夏蒸熱飲冷冷熱
間隔秋夏氣交亦生此疾以要言之終由飲食失常寒暑乖宜上熱下繫將瘧之方吐下為本人有強羸
病有輕重自須臨時斟酌不可一槩言之此病別有所稱厭穰而差者自是人心妄識畏愛生病亦猶弓
影成蟄耳必有不誣此法專意信之亦任其從穰穰之道雖然必須資藥以救之比見用藥攻療無不差
者以法禱之則有不效者以此言之明知病在於內徒勞於外耳此病之始與天行不多別亦頭痛骨肉
酸楚手足逆冷口鼻喉舌乾好飲水毛聳腰脊強欲反拗小便赤但先寒後熱發作有時可不審察其發
作日有準凡經七日以後先服蠶甲生用等五味散取快吐方蠶甲三兩常山甘草各二桂心一兩
右藥搗篩為散煮烏梅湯下初服一方寸匕日二服稍稍加之以得吐為限忌人莧生蔥生菜海藻蒜
菜

又審其候若體力全強日再服每服皆取吐自覺氣力不甚強則每一服取吐晚不得服如全綿悞事須
取吐則三兩日一服經五六度吐訖但適寒溫將息并食飲使體氣漸強若知病雖輕吐根本未似得除

事須利之以洩病勢宜合當歸等六味散服之取利方 當歸 白朮

雨四 右藥搗篩為散平旦空肚以酒飲下初服一方寸匕日再服稍稍加之得利為度候氣力強羸取

利多少一一如前取吐法忌桃李雀肉生葱生菜

又依前覽甲等五味散取吐當歸等六味散利後雖經吐下其源尚在如更吐利又慮冠羸宜合鬼前羽

等十味丸服之方 細辛 橘皮 雨各四 鬼前羽 折省之 如金 白朮 雨五 桂心 地骨皮 雨各四 蜀漆 雨二 甘草 雨三

又當歸 雨五 丁香 雨三 右藥搗篩蜜和丸如梧子煮烏梅飲下之初服十五丸日再稍稍加至三十九服

經三五日後若覺熱甚每服藥後良久任喫三兩口粥飲璧之忌海藻薤菜桃李雀肉生葱

又療此病曾用釋深師一方大有效其方有巴豆皂莢藥蘆三味作丸服雖經困若一服永斷

中

吳昇同並
出第一卷

唐王壽先生外臺祕要方卷六目錄霍亂及嘔吐二十九門

霍亂病源論三首

霍亂臍上築方三首

霍亂不止及洞下洩痢方八首

霍亂煩躁方八首

乾濕霍亂及痰飲方五首

霍亂煩渴方四首

霍亂轉筋方一十四首

三焦脉病論二首

中焦熱及寒洩痢方三首

下焦虛寒方六首

雜療霍亂方四首

嘔噦方四首

嘔逆吐方八首

許仁則療嘔吐方四首

噫醋方七首

霍亂吐痢方一十二首

霍亂腹痛吐痢方七首

霍亂後脉絕手足冷方四首

霍亂衆藥療不效方二首

霍亂心腹痛方三首

霍亂乾嘔方五首

霍亂雜灸法二十六首

上焦熱及寒吐痢腸鳴短氣方九首

下焦熱方六首

許仁則霍亂方三首

乾嘔方六首

噦方七首

嘔逆不下食方八首

雜嘔吐噦方三首

唐王盡先生外臺秘要方卷六

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程行道敬通人訂梓

門人鄭康辰真乙父全校

霍亂病源論三首

病源霍亂者由人溫涼不調陰陽清濁二氣有相干亂之時其亂在於腸胃之間者因遇飲食而變發則心腹絞痛其有先心痛者則先吐先腹痛者則先痢心腹並痛者則吐痢俱發扶風而實者身熱發頭痛體疼而復吐痢虛者但吐痢心腹刺痛而已亦有飲酒食肉好餐腥膻生冷過度或居處不節或處臥濕地或當風取涼而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷則不磨不磨則水穀不消化亦令清濁二氣相干脾胃虛弱便生吐痢水穀不消則令心腹脹滿皆成霍亂霍亂有三名一名胃反言其胃氣虛逆反吐飲食也二名霍亂言其病揮霍之間便致撩亂也三名走哺言其哺食變逆者也診其脉來代者霍亂又脉代而絕者亦霍亂霍亂脉大可療微細不可療霍亂吐下脉微遲氣息劣口不欲言者不可療也養生方云七月食蜜令人暴下發霍亂

出第二十卷中

千金論曰原夫霍亂之為病也皆因食飲非調鬼神飽食脫膈復餐乳酪海陸百品無所不啖眠臥冷席多飲寒漿胃中諸食飽而不消陰陽二氣擁而反戾陽氣欲降陰氣欲升陰陽乖隔變成吐痢頭痛如破百病如解通體清初時為吐轉論證雖小卒病之中最為可畏雖臨深履危不足以喻之也養生者宜達其旨趣庶可免於夭橫者矣

又凡霍亂務在溫和將息若冷則通熱熱則止此為定以遲一日不食為佳仍須三日少少喫粥三日以後乃可恣食食息也七日勿雜食為佳所以養脾胃氣也

出第二卷中

霍亂吐利方一十二首

兩一升
宋本
切字

下宋本作

一經燒焦
宋本作一
杖如鴨子
口字下宋
本有寸切
之三

生字下宋
本有寸切
破八片五
字宋無如
至之加字
制紫以
八字宋本
在下

廣濟除霍亂吐瀉方 扁鵲藥方 一齊紫葉一朮一乾薑 右四味以水六升煮取二升五合

絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里至無所忌

又療冷熱不調霍亂吐瀉宿食不消理中丸方 人參 白朮 甘草 乾薑 高良薑 桂心 右六味搗篩靈丸蜜腹以飯下梧子大三十九日二服漸加至四十丸老小以意減之忌生冷油膩生

蔥海藻荏菹桃李雀肉等物

又療霍亂冷熱不調吐瀉高良薑湯方 高良薑 木瓜 杜梨 枝葉 右三味切以水六升煮取二

升絞去滓空腹溫三服服別如人行六七里至無所忌 四卷中

小品霍亂吐瀉心煩亂髮湯主之方 亂髮 人參 吳茱萸 升 甘草 右四味切以水三升酒

二升煮取二升絞去滓溫服五合忌海藻荏菹

又療霍亂吐瀉已服理中及四逆湯不解者以竹葉湯方 竹葉 虎 小麥 升 生薑 升 甘草 升 兩 人參 升

附子 兩 肉桂 當歸 各二 芍藥 兩 白朮 兩 橘皮 兩 右十一味以水一斗半先煮小麥竹葉取八升

汁去滓內諸藥煮取二升半分三服吐瀉後腹滿加厚朴二兩炙上氣加吳茱萸半升差理中四順則

大熱執毒霍亂宜竹葉湯忌生葱海藻松菜猪肉杭李雀肉等 金方

又霍亂吐瀉而汗出小便復利或下利清穀夏外無熱脈微欲飲或惡寒四肢拘急手足厥逆四逆加猪

膽湯主之方 甘草 乾姜 附子 猪膽汁 右四味切以水二升煮取一升四合溫分再

服無猪膽以羊膽代之強人可與大附子一枚乾薑加至三兩若吐之後吸吸少氣者及下而腹滿者

加人參一兩諸藥皆減為一兩如證者亦宜與理脈人參湯佳忌海藻松菜猪肉 金方

又四順湯與前證同常用此方 人參 甘草 附子 右四味切以水六升煮取二升絞去滓溫分三服轉筋肉令汗出嘔噦者良忌海藻松菜猪肉

同前藥 右方 附子 甘草 附子 右四味切以水六升煮取二升絞去滓溫分三服轉筋肉令汗出嘔噦者良忌海藻松菜猪肉

宋泰無氣

尚論仲景此論即千金之文按傷寒論人參三

又白丸療霍亂嘔吐及暴痢良方 半夏洗二兩 附子炮四兩 乾姜炮四兩 人參兩三 桔梗兩二 右五味作散臨病

和之若吐痢不止者以苦酒和之飲服二九如梧子不差復服耐藥者加之以意下者用蜜和丸亦得

忌猪羊肉錫范汪同並出第四卷中

崔氏理中丸療三焦不通嘔吐不食并霍亂吐逆下痢及不得痢惡主之方 人參兩三 乾薑炮二兩 白朮兩三

甘草三兩 右四味搗篩蜜和丸如梧子平旦取粥清服五丸日再服一方乾薑三兩忌海藻菰菜桃

李雀肉等出第二卷中

延年理中丸療霍亂吐痢宿食不消方 白朮兩二 乾薑炮二兩 人參兩二 甘草兩二 大麥藥二兩 右五味搗

篩蜜和為丸以飲服十五丸如梧子大日再服稍加至二十九忌海藻菰菜桃李雀肉等出第二卷中

必效理中散主霍亂及轉筋吐痢不止方 青木香各八分 桂心 厚朴 甘草各八分 白朮八分 乾薑十分 附子炮六分

右七味搗篩為散飲服兩錢匕如人行五六里不定更服一錢匕差止忌海藻菰菜生葱猪肉

桃李雀肉等

又方 若熱霍亂則渴心煩欲得冷水呿則宜恣意飲冷水及土漿取足定止

霍亂臍上築方三首

病源霍亂而氣塞悸者由吐下之後三焦五藏不和而水氣上乘於心故也腎主水其氣通於陰若吐下

則三焦五藏不和故脾氣亦虛不能制水水不下宣與氣俱上乘心其狀起臍下上從腹至心氣塞塞然

而悸動不定也出第二十卷中

仲景論霍亂臍上築者腎氣動也先療氣理中湯去朮加桂九方加朮者以內虛也加桂者恐作奔豚也

理中湯方 人參兩二 甘草三兩 白朮兩三 乾薑炮三兩 右四味切以水八升煮取三升去滓溫服一升日三

夜一若臍上築者腎氣動也去朮加桂心四兩吐多者去朮加生薑三兩若下多者復用木悸者加茯苓

苓二兩若先時渴喜得水者加朮合前成四兩半若腹中痛者加人參合前成四兩半若惡寒者加乾

小臺必嬰

卷六

霍亂臍上築方三首

二

宋本炮子
下有皮
破六片
字先字下
有完用二
字按字下
有字字下
方以下七
字在下文
卷中下

高德按千
金煎汁服
一升
尚德按千
金用水八
升服三十
丸

升字下宋
本有八土
者三字

薑合前成四兩半若腹滿者去木加附子一枚炮去皮破六片服湯後一食頃飲熱粥一升許汗微出

自溫勿發揭衣被也忌海藻菰菜桃李雀肉等千金備急文仲崔氏集驗必發小品古今錄驗並同

又霍亂臍上築者以吐多故也若吐多者理中湯主之方如前法加減霍亂四逆吐少嘔多者附子梗米湯主之方 附子炮附子半夏洗半升甘草一兩大棗枚十梗米升 右五味切以水八升煮米熟去滓溫服一

升日三忌羊肉猪肉海藻菰菜錫一方有乾薑一兩小品 茯苓二兩甘草三兩乾薑一兩人參三兩木瓜三兩 右五味以水六升煮取三升去滓適寒溫分為四服忌海藻酢物卷中第四

霍亂腹痛吐痢方七首 廣濟療霍亂吐痢方 取桃葉切三升以水五升煮取一升三合分溫二服出第四

范汪理中加二味湯療霍亂胸滿腹痛吐下方 人參三兩乾薑三兩甘草三兩白朮三兩當歸各二兩 右六味以水七升煮取三升絞去滓溫服一升日三甚良忌海藻菰菜桃李雀肉等

又主霍亂腹痛吐下方 取桃葉冬取皮煎汁服一酒杯有效千金云將取汁一升

十金理中湯療霍亂吐下脹滿食不消心腹痛方 人參三兩白朮三兩甘草三兩乾薑三兩 右四味以水六升煮取三升絞去滓溫分三服不差頻進兩三劑遠行防霍亂作九如梧子服二十九散服方寸匕酒

亦得若轉筋者加石膏三兩忌海藻菰菜桃李雀肉等與前仲景方同或別備急集驗小

備急療霍亂吐痢高良薑酒方 高良薑炙令焦香每用五兩打破以酒一升煮取三四沸頻服亦療

霍亂腹痛氣惡出第一卷年同 救急療霍亂初覺不好則用此方主腹痛吐痢香薷湯方 生香薷切一小蒜碎升厚朴切兩生薑切

右四味切以水一斗煮取三升分三服得吐痢止每服皆須溫如吐痢不止用後方

又薤根湯方 生薤根切一生薑一橘皮 右三味切以水八升煮取二升分二服服別相去以意消

息之並出第一卷中

霍亂不止及洞下洩痢方八首

病源霍亂而下痢者是冷氣先入於腸胃腸胃之氣得冷則交擊而痛故霍亂若先腹痛者則先下痢也

出第二十卷中

廣濟療霍亂不止方 取酢漿水三升煮取一升五合內米粉一抄攪調分二服服別相去如人行三四

里並出第四卷中

小品霍亂卒吐下不禁脈暴數者人參湯主之方 人參 茯苓 葛根 陳皮各二兩 麥門冬去心二兩 甘草

二兩

右六味切以水五升煮取二升絞去滓溫分三服忌海藻薤菜酢物並出第四卷中

刪繁療霍亂洞泄不止臍上築築腎氣虛人參理中湯方 人參 乾薑各三兩 茯苓三兩 橘皮四兩

桂心三兩 黃耆二兩 右七味切以水九升煮取三升去滓分溫三服忌海藻薤菜生葱醋物並出第四卷中

又療中焦虛寒洞泄人參湯補虛泄方 人參三兩 甘草二兩 黃芩二兩 當歸三兩 茯苓 乾薑各四兩 厚朴四兩

芎藭三兩 粟米升 右九味切以水一斗五升煮米取熟去米澄取七升下諸藥煎取三升分三服忌海

藻薤菜大酢等物

又療中焦洞泄下痢或因霍亂後瀉黃白無度腹中虛痛黃連湯方 黃連四兩 黃柏三兩 當歸三兩 厚朴二兩

榴皮四兩 乾薑三兩 地榆 阿膠各四兩 右八味切以水九升煮取三升去滓下阿膠更煎取烱分三服忌

猪肉冷水並出第四卷中

千金療霍亂洞下不止方 取艾一把水三升煮取一升頓服之備急同出第二卷中

延年增損理中丸主霍亂下氣能食止洩痢方 人參 白朮 厚朴各二兩 茯苓 甘草各二兩 薑屑分 右

六味搗篩蜜和為丸如梧子大一服十九飲下酒下亦得加至十五二十九忌生冷海藻薤菜桃李雀

黃連上家
木青金
二字
石欄上家
本行帳字

何膠三兩
下宋本云
碎熬令黃
然後末

生字下本
本有去皮
破六片五
高燒按此
證仲景用
加猪膽汁
湯通脈四
逆湯及後
在少陰病
中與此證
小異

肉大醋出第六

以效摩霍亂水痢腹中雷鳴無不差烏梅黃連散方 烏梅肉 黃連 熟艾葉各三 赤石脂二兩當歸

甘草三兩附子二兩阿膠炒二兩

右八味搗篩為散有患者每服二方寸匕疑熱則飲下疑冷則酒下

忌海藻菰菜猪肉冷水

霍亂後脈絕手足冷方四首

病源霍亂而大吐下後其腸胃俱虛乃至汗出其脈欲絕手足皆冷名為四逆四逆者謂陰陽卒厥絕也

世第二十

仲景傷寒論既吐且痢而大汗出小便復利或下利清穀裏寒外熱脈微欲絕或發熱惡寒四肢拘急手

足厥逆者四逆湯主之方 甘草二兩附子一枚乾薑一兩 右三味切以水三升煮取一升二合去滓

溫分二服加減依後法忌海藻菰菜猪肉

又吐已下斷汗出厥冷四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆湯主之方 甘草二兩大附子一枚乾薑六

片乾薑三兩 右三味以水三升煮取一升二合去滓溫分二服其脈即出愈若面色赤者加葱九莖

若腹中痛者去蔥加芍藥二兩若嘔者加生薑二兩若咽痛者去芍藥加桔梗一兩若利止脈不出者

去桔梗加人參二兩病皆與方相應乃合服之若吐利止身疼痛不休者消息和其外傷寒論中又有

療諸發熱霍亂者蓄取之忌海藻菰菜猪肉

品扶老理中散并作丸長服亦得療羸老冷氣惡心食飲不化腹虛滿拘急短氣及霍亂嘔逆四肢厥小

冷心煩氣悶流汗悉主之方 人參兩乾薑兩白朮兩五苓散附子炮茯苓各三甘草五兩 右七味

作散臨病煮取三合白湯飲和方寸匕一服不效又服常將藥丸酒服如梧子二十九忌海藻菰菜猪

肉桃李雀肉大醋

十金同出
第四卷中

為德按十
金四兩
而大處二
十五枚
又按千金
云當方用
云云

或肘後作
若宋本同
尚後按肘
復作字下
有無新藥
者得宋本
七字宋本
同

亂髮下家
未云髮如
雞子髮如

千金四逆湯主多寒手足厥冷脈絕方 吳茱萸二兩當歸 桂心 芍藥各二兩 甘草 通草各一兩 生薑八

甘草二兩 大棗十二枚 右九味切水六升清酒六升合煮取三升分溫三服舊方是二十五枚今以

霍亂去多諸故除之若除棗入葛根二兩佳思生慈生家海藻松葉小品內有霍亂方名

霍亂煩躁方八首

病源霍亂之後煩躁卧不安者由吐下之後新臟虛極陰陽未理血虛氣亂故二氣之行未復常度內乘

於腑臟故煩躁而不得安卧也世第二十

肘後霍亂後煩躁卧不安急白大棗湯方 葱白二十 大棗二十 右二味以水二升半煮取一升去滓

頓服之文仲

又療霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下方 生薑或乾薑一小升 右一味以水五升煮三沸頓

服若不即愈可更作

又方 住心屑半升以暖飲二升和之盡服忌生葱急同並出

又仲療霍亂煩躁方 濃煮竹葉飲五升令灼灼爾以淋轉筋處肘後備

又方 服乾薑屑三兩方寸匕肘後備

又方 小蒜一升以暖水三升煮取一升頓服之肘後同並出

又急療霍亂煩躁方 黃果半升半升水一升半和攪如白飯頓服糯米煮得

又方 燒亂髮如雞子大以鹽湯三升和服之不吐復服世第二十

霍亂眾藥療不效方二首

小品療霍亂諸藥不能療亂髮湯方 亂髮世第二十 附子世第二十 甘草世第二十 右四味切以水六升

煮取三升去滓服分三服忌豬肉海藻菰菜世第四

千金人參湯療毒冷霍亂吐痢煩嘔轉筋虛冷汗出手足指浮腫氣息垂絕絕語音聲不出百方不效脈

寸重必重世第二十

高唐按十
金十味各
二兩

六十枚下
宋本云去
心皮煮研
如脂

不通者服此湯取差乃止隨吐者續更服勿住方 人參 附子 炮厚朴 炙茯苓 甘草 炙橘皮 當歸

萬根各二兩 桂心 乾薑各三兩 右十味以水七升煮取二升半分溫三服忌海藻菘菜生蔥大酢出第

乾濕霍亂及痰飲方五首

病源霍亂者多吐痢也乾霍亂者冷氣搏於胃飲食不消但腹滿煩亂絞痛短氣其腸胃先挾實故不吐

痢名為乾霍亂也出第二十 救急療霍亂無問乾濕冷熱等末香湯方 青木香各三兩 高良薑二兩 豆蔻子一枚 右三味咬咀以水一大

升煮取半升頓服之則定

又方 取烏牛尿二兩以水二升煮沸絞濾頓服之大良

又生薑湯方 以東壁土一把生薑一大兩碎之 右二味用水一大升煮取半升澄清熱飲之如渴依

前進一卷中

必效療上吐下痢者名為濕霍亂方 黃牛尿半大升許取水一大升煮三兩沸和牛尿施取汁服半升

即止卑牛子屎亦佳無牛處常將乾者相隨亦好用備急產氏花注

又四神丸主霍亂冷實不除及度飲百病無所不主方 乾薑 桂心各一兩 附子一兩 已豆六枚 右四

味末之蜜和為丸如小豆大飲服二丸取快下不下又服一九忌生葱野猪肉蘆笋胡合同出

霍亂心腹痛方三首

病源霍亂而心腹痛者是風邪之氣客於臟腑之間冷氣與真氣相擊或上攻心或下攻腹故心腹痛也

廣濟療霍亂心腹痛煩嘔不止厚朴人參湯方 厚朴四兩 橘皮 人參各二兩 高良薑 當歸 藿香各一

兩 右六味以水七升煮取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里忌生冷粘膩出第

二卷中

二卷中

二卷中

二卷中

尚德按正
疑當作出

尚德按正
疑當作出

中

肘後療霍亂若絞痛不止方 薑二鼓二鼓升 合搏中分為兩分手捻令如粉熬令灼灼爾更番以熨臍中

取愈並第一卷中

千金霍亂蠱毒宿食心腹痛冷氣鬼氣方 極鹹鹽湯三升一味霍亂心腹暴痛宿食不消積冷煩滿者

熱飲一升以指刺口令吐宿食使盡不盡更服吐訖復飲三吐住靜止此法大勝諸藥俗人以為田舍

淺近法鄙而不用守死而已凡有此疾即須先用之備急霍亂方卷中

霍亂煩渴方四首

病源霍亂而煩渴者由大吐逆上焦虛氣不調氣乘於心則煩悶也大利則津液竭津液竭則藏躁藏躁

則渴也煩渴不止則引飲引飲則利亦不止出第二十卷中

肘後療霍亂吐下後大渴多飲則殺人方 黃粱米五升水一斗煮之令得三升汁澄清稍稍飲之勿飲

餘飲備急同精米亦出第二卷中

備急近效療霍亂不吐不下食氣急而渴方 木瓜一枚切以水四升煮取二升細細飲盡更作吐不止

者亦差若渴唯飲此湯佳根莖亦可用此湯令人吐出第一卷中

必效霍亂渴方 糯米二升薄取泔飲訖則定若不渴不須一方渴者服之并當飽又云所糯米取自汁

恣意飲之以差為度乾霍亂出第三卷中

又療霍亂後渴口乾腹痛不止者厚朴桂心湯方 厚朴四兩桂心二兩 右二味切以水四升煮取一升

二合絞去滓內分六合細細飲之服了如其渴欲得冷水盡意飲之長安傳少府常服志生慈出第二卷中

霍亂乾嘔方五首

病源霍亂而乾嘔者由吐下之後脾胃虛極上焦不理氣痞結於心下氣時逆上故乾嘔乾嘔者謂欲嘔

而無所出也若更遇冷冷折胃氣胃氣不通則變噦也出第二十卷中

時後療苦嘔不息方

取雞白一虎口切以水三升煮令得一升半服之不過三度

備急

又乾薑茶葉湯方

乾薑切吳茱萸

各二兩

右二味以水二升煮取一升頓服之下不止手足逆冷者加

椒百粒附子一枚炮水三升煮取一升頓服

卷中

厚朴湯方

厚朴

四兩

乾扁豆葉

二兩

茯苓

白朮

刪繁療霍亂後不欲食胃弱嘔吐不止厚朴湯方

厚朴

四兩

乾扁豆葉

二兩

茯苓

白朮

五兩

右

五味切以水七升煮取二升分三服忌桃李大醋雀肉等

卷中

生薑五兩水五升煮取二升半

分二服

又煮高良薑飲之

大佳

延年

補急

千金療霍亂引飲後輒乾嘔方

生薑

五兩

水五升

煮取二升半

分二服

又煮高良薑飲之

大佳

延年

小品

霍亂

卷中

生薑

五兩

水五升

煮取二升半

分二服

又煮高良薑飲之

經心錄療霍亂後煩嘔厚朴湯方

厚朴

二兩

生薑

三兩

枳實

三兩

右三味切以水六升煮取二升分三

服

霍亂轉筋方一十四首

病源霍亂而轉筋者由冷氣入於筋故也足之三陰三陽之筋起於足指手之三陰三陽之筋起於手指並循絡於身夫霍亂大吐下之後陰陽俱虛血氣虛極則手足逆冷而榮衛不理冷搏於筋則筋為之轉冷入於足之三陰三陽則脚筋轉入於手之三陰三陽則手筋轉隨冷所入之筋筋則轉轉者由邪冷之氣擊動其筋而移轉也又轉筋者由榮衛氣虛風冷搏於筋故也手足之三陰三陽之筋皆起於手足指而並絡於身若血氣不足陰陽虛者風冷邪氣中其筋隨邪所中之筋筋則轉轉者謂其轉動也經云足太陽下血氣皆少則喜轉筋若踵下痛者是血氣少則陽虛虛而風冷乘之故也診其左手關上肝脉也沉為陰陰實者肝實也若內動轉筋左手尺中名神門以後脉足少陰經也浮為陽陽虛者病苦轉筋其湯熨針石別有正方補養宣導令附於後養生方導引法云偃臥展兩腰兩手外踵者相向令鼻內氣自極七息除兩膝寒脛骨疼轉筋又云覆臥傍視立兩踵伸腰鼻內氣去轉筋又云張脛兩足指號五息止令人不轉筋極自用力張脚痛挽兩足指號言寬大去筋節急掌蹙痛久行身開張又云覆臥傍視立兩

仲病
宋同

一兩下家
洗却膩

尚飽接到
下同

後有欲
二字宋本

止有欲
二字宋本

後有欲
二字宋本

此種本上
四字宋本

者樟木六
字宋本

尚德按作
字千金在

踵伸腰以鼻內氣自極七息除胸中弦痛轉筋酸疼一本云療脚弱

出第二十卷中

廣濟療霍亂吐痢轉筋欲入腹高良薑湯方 高良薑 桂心

各四兩

右二味切以水七升煮取二升去

滓分三服如人行四五里一服忌生冷生蔥

又療霍亂轉筋不止茱萸湯方 吳茱萸升甘草炙乾薑

各二兩

芩子

一兩

桂心

水七升煮取二升三合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里忌生蔥海藻菰菜生冷粘膩等

又療轉筋方 取故綿多取醋醋中蒸及熱用裹病人脚冷更易勿停差止

千金同並出第四卷中

肘後療兩臂脚及胸骨轉筋者方 取鹽一升半水一斗煮令熟灼灼爾清手足在胸骨者湯洗之轉筋

入腹中到擔病人令頭在下腹中平乃止若劇者引陰陰縮必死猶在到擔之可冀活耳

又方 煮苦酒三沸浸乾薑轉筋上合少粉尤佳又以綿纏膝下至足

補急同

又若轉筋入腹中轉者佳 取雞屎白一方寸匕水六合煮三沸溫頓服勿令病者知

仲景心經備

又若霍亂注痢不止而轉筋入腹欲死者方 生薑三兩搗破以酒一升煮三四沸頓服之

急同出第二

中卷

刪繁療古強筋縮牽陰股引胸腹脹痛霍亂黃龍藤湯方 黃龍藤切一升

此種本上藤也斷以吸氣從中貫度者好也

右一物以水四升煮取八合為一服一劑不止更至一劑良驗或宿食不消霍亂或乾霍亂或吐痢不

止或不吐利並悉療之

出第三卷中

千金霍亂轉筋入腹不可奈何方 極鹹作鹽湯於糟中煖漬之則差

小品集驗同按糟千金作糟

又方 以醋煮青布揄脚膝冷復易之

補急文仲崔氏小

又方 募一把去兩頭以水二升煮取一升頓服急同並出第二十卷中

救急霍亂脚轉筋絕四肢已冷強氣絕心上微暖者猶可救之方 取硃砂二兩熟研蠟三兩和之為丸

待冷著大籠中如重衣被厚覆勿令煙洩兼膝下著火令腹微暖微良久當汗則漸氣通便活忌生血

物出第一

必效主霍亂脚轉筋及入腹方以手拗所患脚大母指灸當脚心下急筋上七壯

又方 小瓜子根皮合煮湯服之

出第三
卷中

霍亂雜灸法二十六首

時後療霍亂先腹痛者法灸臍上四十壯名太倉在心厭下四寸更度之千金謂急在氏古令歸驗同通按銅人經中管一名太

寸食在膈上
胃募也

灸臍邊二寸男左女右十四壯甚者至三十四壯名大腸募也古今經驗同

古今錄驗同

又療轉筋者法 灸腳心下名湧泉 又灸當足大母指聚筋上六七壯神驗 又灸足大指下中一

壯翼千金及

又療轉筋入腹痛者法 令四人捉手足灸臍左二寸十四壯 又灸股中大筋上去陰一寸

又療苦腕方法揣按方後作者灸手腕第一約理中七壯名心主當中指

時者
後德
作按
者方

又療下痢不止者法灸足大指本節內側一寸白肉際左右七壯名大都千金通按銅人經大都穴在足大指本節後陷中

指撥
本銅
節人
後經
昭大
中却
二

灸兩乳邊連黑外近腋白肉際各七壯可至二七壯

又療苦煩悶急滿法 灸心厭下三寸七壯名胃管

文仲

又法以鹽內臍中灸上二七壯文仲千金翼同

同十

又療苦繞臍痛急者法灸臍下三寸三七壯名關元良文仲同

文仲

又療先吐者方灸心下一寸十四壯又并療下痢不止上氣灸五十壯名巨闕正心厥去頭下一寸

也
經千金翼文仲在下
一備寸心之暮也

千金翼文仲氏備急同按人經巨附在鳴尾下一寸心之募也

又癰霍亂神祕起死灸法
以物橫度病人口中屈之從心煇尾度以下灸度下頭五壯橫度左右復灸

五壯此三處併當先灸中央畢更橫度左右也又灸脊上以物圍令正當心厭又灸脊左右一寸各一

壯是腹背各灸三處神文

又華佗療霍亂已死上屋喚魂者又以諸療皆至而猶不差者法捧病人覆臥之伸臂對以繩度兩肘

共頭依繩下夾背脊大骨室中去脊各一寸灸之百壯無不活者所謂灸肘椎室囊歸已試數百人皆

灸畢即起坐佗以此術傳其子孫世世皆秘之不傳並出第一卷中

千金凡得霍亂灸之或時雖未立差終無危憂不可逆灸或但先腹痛或先下後吐當隨病灸之

又療霍亂灸法 灸穀門穴在臍傍二寸男左女右一名大腸募灸二七壯不止又灸如前數鍼經天樞

臍一名長路一名穀門穴

又療吐下不禁兩手三陰三陽脉俱疾數者法 灸心厭骨下三寸又灸臍下三寸各六七十壯

又療乾嘔者法 灸間使穴在手掌後三寸兩筋間左右各灸七壯不差更灸如前數肘後文神

又療手足逆冷者法 灸三陰交穴在足內踝直上三寸廉骨際陷中左右七壯不差更灸如前數肘後

同錄

又療轉筋不止者法 灸足踵聚筋上白肉際七壯立愈

又療走嘔轉筋者法 灸踝白肉際左右各二十一壯 又灸小腹下橫骨中央隨年壯

又療轉筋四厥者法 灸兩乳根黑際各一壯

又療轉筋在兩脅及胸中法 灸手掌白肉際七壯又灸臍中中府巨闕胃管尺澤以上并療筋拘頸足

學者皆愈

又療轉筋不止者法 若是男子手挽其陰牽之女子挽其乳逐左右邊

又療轉筋欲死者法常作法下同 合四人手持足灸臍上一寸十四壯自不動勿復持之又按手持十

又療霍亂吐利所傷煩欲死者法 灸慈宮各二十壯慈宮在橫骨兩邊各二十半橫骨在臍下橫門骨

是也並出第二十卷中 通按甲乙經經前門一名慈

救急瘵霍亂心腹痛脹吐痢煩悶不止則宜灸之方 令病人覆卧伸兩臂膊著身則以小繩正當兩肘
骨尖頭從背上量度當脊骨中央繩下點之去皮又取繩量病人口至兩吻截斷便中折之則以度向
所點背下兩邊各依度長短點之三處一時下大灸絕便定神驗艾炷大稍加也

又瘵霍亂轉筋不止漸欲入腹凡轉筋能殺人起死之法無過於灸灸法唯三處要穴第一承筋穴在腓
股下際取穴法 以繩從腳心下度至腳踵便截斷度則以此度從腳踵縱量向上盡度頃當腓下際宛

宛中是穴灸三七壯則定 又不止則灸涌泉在足心下當足大指中節後一寸半正當大筋上是穴
又灸足跟後黑白肉交際當中央此三處要穴灸之不過二三七壯必定並出第
一卷中

三焦脉病論二首

刪繁論曰夫三焦者一名三關也上焦名三管反行中焦名霍亂下焦名走哺合而為一有名無形主五
藏六腑往還神道周身貫體可聞不可見和利精氣決通水道息氣脾胃之間不可不知也凡上焦三管
反射者通三焦名中清之腑也別號玉海水道出屬膀胱合者雖合而不同上中下三焦同號為孤之腑
也而榮出中焦衛出上焦神者是經脉之氣道也上焦如霧霧者霏霏起上也起於胃上管並咽以上貫膈布胸
中走腋循足太陰之分而行還注手陽明上至舌下注足陽明常以榮衛俱行於陽二十五度行陰亦二
十五度為一周日夜五十周身周而復始大會於手太陰手少陽也主心肺之病內而不出人有熱則飲
食下胃其氣未定汗則出或出於面或出於背或出於身手皆不循衛氣之道而出蓋外傷於風內開腠
理毛蒸理泄衛氣走之故不得循其道此氣慄悍滑疾見關而出故不得其道名曰漏泄其病則肘掌痛
食先吐而後下氣不續胸膈悶厭悶所以飲食先吐而後下也寒則精神不守泄下便利語聲不出若實
則上絕於心若虛則引氣於肺中下全同

千金論曰三焦病者腹脹氣滿少腹尤堅不得小便窘急溢則為水留則為脹候在足太陽之外大絡在
太陽少陽之間亦見于脉取委陽少腹病腫痛不得小便邪在三焦約取太陽大絡視其結脉與厥陰小

尚使按血
者下字金
有上字
胃管取三
里八字

八兩下家
本有碎字

人參上家
本有上家
二字

通按理中
湯內有
黃白生薑
人可主薑
根不卜何

尚使按生
薑根不金
作生薑水
外生薑水
本云生薑

破本改字
下有去字
二字去字
下有及病

絡結而血者三焦脹者氣滿在皮膚穀穀然而不堅手少陽之脉是動則病耳聾暈暈焯焯噎喉痹是
主氣所生病者汗出目銳皆痛煩痛耳後肩膊肘臂外皆痛小指次指不用為此諸病寒則留之熱則疾
之陷下則灸之不感不虛以經取之盛者人迎一倍於寸口虛者人迎反小於寸口
出第二
十卷中

上焦熱及寒吐痢腸鳴短氣方九首

刪繁瘵上焦實熱飲食下胃其氣未定汗出面背身中皆熱名白濁氣通脉瀉熱澤瀉湯方 澤瀉二生

地骨皮兩五甘草兩一半夏兩二石膏兩八柴胡 茯苓 生薑兩三竹葉切合五人參兩二桂心兩一蓴心升一

右十二味切以水一斗煮取三升分三服忌海藻菘菜羊肉錫醋生蔥升金

人瘵上焦熱腹滿而不欲食或食先吐而後下肘臂皆痛麥門冬理中湯方 生麥門冬升一生薑兩四白木

雨甘草兩二人參兩三茯苓兩二橘皮兩三生薑根升一蓴心合五姜糖兩三棗栗升一右十二味切以水

一斗五升煮取三升分三服忌海藻菘菜大醋桃李雀肉等升金

人瘵上焦氣不續胸膈間厭問所以飲食先吐而後下半夏理中續膈破寒湯方 半夏半升生薑兩四麻

黃兩二前胡 澤瀉兩三竹葉升一細辛 枳實兩二杏仁各三右九味切以水九升煮取三升去滓分

三服忌羊肉錫生菜等物

人瘵上焦熱牽肘掌心痛喘欬短氣動而好唾潤肺止心痛大棗湯方 大棗三十杏仁升一人參各三

紫莞兩二姜糖 麥門冬兩二百部 通草兩三石膏兩八五味子兩一羊腎三枚麻黃三兩右十二味切以

水一斗煮取二升五合去滓下蜜三合生薑汁三合淡竹瀝三合更上火煎取三升分三服

人瘵上焦虛寒精神不守泄下便利語聲不出茯苓安心湯方 茯苓 人參 乾薑兩三桂心兩一遠志

皮兩三甘草兩二右六味切以水九升煮取三升去滓分三服忌生蔥醋物海藻菘菜等物

人瘵上焦虛寒腸鳴下利心下痞堅半夏瀉心湯方 半夏兩五黃芩 甘草兩二人參 乾薑兩三黃連

一桂心兩三右七味以水九升煮取三升去滓分三服忌海藻菘菜錫羊肉生蔥豬肉冷水此仲景半

仁者四字
八兩下有
碎字一兩
作二兩三
秋下有細
碎二字
洗字下宋
本有四個
二字
本有雙仁
按三字
尚德按十
金書三
尚德按十
金書三
八合玄參
四兩
又按千金
以水二升
煮取五升
分為五服
尚德按十
千金作社

中焦熱及寒洩痢方三首

千金瘰癧上焦虛寒短氣語聲不出黃耆理中湯方 黃耆 桂心各二兩 丹參四兩一作人參 桔梗 乾薑 五味

子 茯苓 甘草各三兩 杏仁四兩去皮 芎藭二兩 右十味切以水九升煮取三升絞去滓溫分三服忌海

藻松菜猪肉生葱大醋同煎 又瘰癧上焦冷下痢腹內不安食好注下黃連丸方 黃連兩 乾薑兩 梔子兩 烏梅肉兩 附子兩 桂心一兩

芎藭 黃柏各三兩 阿膠四兩 右九味末之白蜜和為丸如梧子大飲下二十九加至三十九忌猪肉

冷水生葱等同煎 又瘰癧上焦閉塞乾嘔嘔而不出熱少冷多好吐白沫清涎吞酸厚朴湯方 厚朴四兩 吳茱萸五兩 人參三兩

茯苓兩 桔梗兩 生薑兩 玄參兩 芎藭 白朮各四兩 附子兩 橘皮三兩 右十一味切以水九升煮取

三升絞去滓分三服忌猪肉桃李雀肉大醋同煎 中焦熱及寒洩痢方三首

刪繁論曰中焦如瀉中如瀉也起於胃中管在上焦之後此受氣泌糟粕蒸津液化其精微上注於肺脈

乃化而為血奉以生身莫貴於此故獨得行於經隨名曰榮氣主足陽明陽明別號曰豐隆在外踝上去

踝八寸別走太陰絡諸經之脈上下路太倉主熱五穀不吐不下實則生熱熱則閉塞不通上下隔絕虛

則生寒寒則洞泄便痢霍亂主脾胃之病夫血與氣異形而同類衛是精氣榮是神氣故血與氣異形而

同類焉奪血無汗衄衄奪汗無血衄衄故人有一死而無再生也猶精神之氣隔絕也若虛則補於胃實

則寫於脾調其中和其源萬不遺一也千金 又瘰癧中焦實熱閉塞上下不通隔絕關格不吐不下腹滿彭彭喘急大黃瀉熱開關格通隔絕湯方 大

黃別切 黃芩 澤瀉 升麻各三兩 羊角 梔子仁各四兩 生地黃汁升 玄參兩 芒硝三兩 右九味切

以水七升先煮七味取二升三合下大黃更煎數沸絞去滓下硝分三服忌蕪荳千金

同

同

同

同

二七根下
求本有去
核二字

高德按十
金以水九
升煮取二

秋字下家
本有熱令
費去虎共
六字
柳家本作
柳家千全
高德按十
金無柳有
地榆且兩

芭蕉根切 桔梗切 連子仁切

右九物切以水九升煮取三升去滓分三服忌猪肉卷第四

千金瘰癧下焦熱或痢下膿血煩悶恍惚赤石脂湯方 赤石脂八兩烏梅肉十兩梔子仁十四兩白朮三兩乾薑

二厚米一升麻三兩右七味切以水一斗煮米取熟去米取七升下諸藥煮取二升五合去滓分三服

忌桃李雀肉等同前

又療下焦熱毒痢魚腦雜痢鮮血臍下少腹絞痛不可忍欲痢不出香豉湯方 香豉一升梔子四兩白朮

黃連 黃柏各三兩地榆四兩白朮 葛根各三兩右九味切以水一斗煮取三升分三服忌猪

肉冷水桃李雀肉等同前

下焦虛寒方六首

刪繁療下焦虛寒大便洞泄不止柏皮湯止痢方 黃柏三兩黃連五兩人參三兩茯苓 厚朴四兩艾葉一兩地

榆三兩檉皮四兩阿膠三兩右九味切以水一斗煮取三升去滓下膠煎取二升分三服忌猪肉冷水

醋等同前

又療下焦虛寒津液不止氣欲絕人參續氣湯方 人參 橘皮去白茯苓 烏梅皮 麥門冬去黃者

芍藥 乾薑各三兩白朮 厚朴四兩桂心二兩吳茱萸各三兩右十二味切以水一斗二升煮取三升去滓

分三服忌桃李雀肉生葱醋物同前

又療下焦虛寒損腹中瘀血令人喜忘不欲聞人聲胸中氣塞而短氣茯苓丸方 茯苓八分甘草七分告

仁五十人朱砂一分厚朴五兩乾薑六兩黃耆六兩桂心四兩當歸八兩芎藭八兩乾地黃八兩右十一味搗篩下蜜和

為丸如梧子初服二十九丸加至三十丸日再服清血飲進之忌海藻松菜生葱酢物薑薑等

又療下焦虛寒損或先見血後通將此為近血或利不利伏龍肝湯方 伏龍肝五兩甘草二兩乾薑二兩黃

柏五兩黃芩 升麻根 柳二兩雞頭髮屑各二兩阿膠二兩右九味切以水七升煮取三升去滓下阿膠

更煎取膠下髮屑分三服忌海藻松菜生葱酢物同前

高連地止 利千金作 入按千金 精斷當歸 桂心蒲黃 何膠各一 兩德換千 金乾薑乾 地黃柏枝 皮各三兩 升伏龍肝 一升

宋本無字 下有堪字 九字下宜 出之二字 三九下可 九字

十金療下焦虛寒竭或先便轉後見血此為遠血或利下或不利好因勞冷而發續斷止利湯方 續斷

當歸各三乾薑四蒲黃分桂心甘草二兩乾地黃兩四何膠二兩右八味以水九升煮六味取三升五

合去滓下阿膠史煎取膠烱盡下蒲黃分三服忌海藻菰菜生蔥薤蕒

又療三焦虛損或上下發世吐唾血皆從三焦因起或熱損發或虛寒損發或因勞發或因酒發當歸湯

方當歸三兩芍藥兩四羚羊角三兩伏龍肝心黃芩乾地黃兩各二白木兩四青竹皮升柏枝炙小薊阿

膠三兩乾薑甘草兩各二蒲黃合亂髮一兩燒灰家本有如雞子三字下右十五味切以水一斗二升煮十二味

取三升五合去滓下阿膠煎取膠烱下髮灰蒲黃分三服忌海藻菰菜蕒薤桃李雀肉等 第二十二卷中

許仁則療霍亂方三首

許仁則云此病有兩種一名乾霍一名濕霍乾霍死者多濕霍死者少俱緣飲食不節將息失宜乾霍之

狀心腹脹滿澀刺疼痛煩悶不可忍手足逆冷甚者流汗如水大小便不通求吐不出求利不下須臾不

救便有性命之慮濕霍之狀心腹亦攪痛諸候有與乾同但吐痢無限此病始得有與天行相似者亦令

頭痛骨內酸楚手足逆冷四體發熱乾霍大小便不通煩冤欲死宜與巴豆等三味丸服之服取快利

方巴豆一百粒熬乾薑五兩代與千金同大黃兩五右藥先搗乾薑大黃為散後別搗巴豆如膏和前

二味同搗令調細細下蜜丸以飲下初服三九如梧子大服訖數按肚令轉動速下利良久不覺則以

熱飲投之又良久不利更服一丸須臾當利後好將息食飲寒溫以意取適如渴者煮漿水粥少少

啜之忌野猪肉麋兔等物 仲文

人暴濕霍亂吐痢無限宜合高良薑等三味飲子服之方高良薑兩二豆蔻子枚二桂心兩二右藥切以

水四升煮取一升去滓細細啜之亦有於此方加乾薑人參二物忌生蔥

木瓜桂心二物飲之方木瓜乾薑得桂心二右藥以水二升煮取七合去滓細細飲之亦有豆蔻

子代桂心者亦有單煮木瓜汁飲之忌生蔥 吳并同出 第一卷中

雜療霍亂方四首

雜療霍亂方四首 乾嘔方六首

十

小品療霍亂嘔氣厥不得喘息鼓湯方

鼓升半夏

一兩

生薑

二兩

柴胡

甘草

一兩

右六味

切以水五升煮取二升半溫服七合忌羊肉錫海藻菰菜等

心一金有桂

人療卒道中得霍亂無有方藥氣息危急暫視捨去皆云必死療之方

薤蓮農一大把煮令味濃頓服

二升則差已用有效食中魚蟹毒者服之尤良

文蓋經菰菜是也 薤蓮農一大把煮令味濃頓服

川掌療霍亂食不消腸鳴腹痛熱不止桔梗湯方

桔梗

四兩

白朮

五兩

茯苓

三兩

倉米升

以水八升煮倉米熟去米將汁煮藥取二升絞去滓分服忌桃李雀肉猪肉大酢

之飲訶梨勒散療一切風氣痰冷霍亂食不消大便澀方

取訶梨勒三顆擣取皮和酒頓服三五度則

差

乾嘔方六首

病源乾嘔者胃氣逆故也但嘔而欲吐吐而無所出故謂之乾嘔也

出第二十卷中

厥濟療卒乾嘔不息方

破雞子去白吞中黃數枚則愈

張文慎急

又方 生葛根絞取汁服一升

又方 甘蔗汁溫令熱服一升日三服

一云甘草汁 張文

集驗療病人乾嘔方

取羊乳汁飲一杯

千金

又療吐逆乾嘔生薑湯方

生薑

四兩

澤瀉

三兩

桂心

二兩

橘皮

三兩

甘草

二兩

茯苓

四兩

人參

一兩

大黃

四兩

以水七升煮取三升服五合日三忌海藻菰菜醋物生蔥

崔氏療患嘔人參湯方

人參

一兩

胡麻仁

八合

橘皮

二兩

枇杷葉

半斤

枳實

半斤

右四味切以水一斗煮枇杷

葉取五升汁內人參等三種煎取三升稍飲之

除王張文仲千金

嘔噦方四首

卷字下宋
本有中字

尚德按肘
後拭字下
有去字無
靈字

病源嘔噦之病者由脾胃有邪穀氣不消所為也胃受邪氣逆則嘔脾受邪脾脹氣逆遇冷折之氣逆不通則噦也

出第二卷

廣濟療嘔噦不止橘皮湯方
橘皮升生薑兩甘草二兩枳實四兩枳葉兩
右四味切以水五升煮取二

升五合絞去滓分溫三服每服相去如人行六七里忌海藻松菜

卷中第一

月後療嘔方 生薑黃芩斷之當汁出器承取飲一升生葛藤尤佳

又方 枇杷葉一斤 拭毛蜜炙水一斗 煮取三升分再服 備急同出第一卷中

第一卷中

必效瘡咽喘方 取蘆根五兩切以水五升者取三升頓服兼以童子小便一兩合不過三服則差

出第
二卷

噦方七首

火源脾胃俱虛受於風邪故令新穀入胃不能傳化故穀之氣與新穀相干胃氣則逆胃逆則脾脹脾脹則氣逆因遇冷折之則噦也右手關上脉沉而虛者病善噦也

出第二十卷中

出第二十卷中

肘後療卒嘔不止方
痛抓眉中央閉氣也

又方以物刺鼻中若以少許皂莢屑內鼻中令嚏則差

又方但閉氣抑引之

又方 好豉二升者取汁服之同千金

千金

又方 桑米粉二升并華水服之

三卷中

集驗療摩喘方 和實三枚炙去核吹咀之以三家乳一升以羊脂五兩煎和實令沸復內乳令沸去滓

含咽之范第六卷門中出

卷中

張文仲陶氏吮方 飲新汲井水數升佳 時後備急千金同出第六卷中

同出第六卷中

嘔逆吐方八首

兩極接兩
要略作隔

洗字下宋
本有壽完
用三字
本有物字

或字下宋
本有則字
四字家本
作二

病源嘔吐者皆由脾胃虛弱受於風邪所為也若風邪在胃則嘔隔間有停飲胃內有久寒則嘔而吐其
狀長太息心震漚漚然或煩滿而大便難或澹泄並其候養生方云八月勿食薑一云被霜瓜向冬發寒
熱及溫病食欲吐或心中停飲不消或為反胃其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引
法云正坐兩手向後捉腕反向拓席盡勢使腹弦弦上下七左右換手亦然除腹肚冷風宿氣或胃口冷
食飲進退吐逆不下入云偃臥展兩脛兩手左右躡兩足踵以鼻內氣自極七息除腹中病食苦嘔又云
坐直舒兩足以兩手挽兩足自極十二通愈腸胃不能受食吐逆以兩手直叉兩腳底兩腳痛舒以頭抵
膝上自極十二通愈腸胃不能受食吐逆一卷第二十

仲景傷寒論嘔吐病在隔上後必思水者急與之思水與猪苓散方 猪苓去茯苓 白朮 右三味各
等分搗篩飲汁和服方寸匕日三服飲飲水者極與之本虛與水則噦攻其熱亦噦忌桃李雀肉醋物

千金同出第
十六卷中

必效小麥湯主嘔吐不止方 小麥一升人參兩四青竹茹二兩茯苓三兩厚朴四兩甘草一兩生薑汁三

右七味以水八升煮取三升分三服忌海藻菰菜酢同金

又凡服湯嘔逆不入腹者方 先單煮炙甘草三小兩以水三升煮取二升服之得吐但更服不吐益好

消息定然後服餘湯則流利更不吐也忌海藻菰菜千金同並出

又延年人參飲主吐方 人參兩一橘皮兩三生薑兩一右三味切以水四升煮取一升五合分溫三服出第六

又麥門冬飲主風邪熱氣衝心心悶短氣吐不下食方 麥門冬二兩人參 橘皮各一兩生薑兩三羚羊角

屑一兩 右五味切以水五升煮取一升五合去滓分溫三服

又甘草飲主脾腎冷氣氣乘心痛悶吐利四肢逆冷或煩疼方 甘草吳人參各二兩乾薑兩四厚朴吳白朮各

右五味切以水五升煮取一升五合去滓分溫三四服如人行八九里忌海藻菰菜桃李雀肉等

出第
卷中

白油麻一大合以清酒半升煎取三合看冷熱得所去由麻以酒頓服之立愈無

麻仁三合搗以水研取汁著少鹽喫立效李時珍用有效

訶梨勒三宋本作核煨

尚德按訶梨勒唐本草云冷氣
食仲景亦止云療氣痢而已並無
瀉腸之

豆蔻子七枚 生薑五片 人參

如人行五六里忌海藻松菜

柴胡 茯苓各八分 橘皮 人參

右十味切以水八升煮取二

去如人行六七里進一服不吐利忌海藻菘菜醋物猪肉等

柴胡分茯苓

右七味切以水

忌海藻菰菜酢物桃李雀肉麋炙肉油膩

生地黃汁合六 蘆根握一 麥門冬去一升 人參分八 白蜜合三 橘

右七味切

一服不利忌蕪荑生冷麪炙肉蕎麪猪肉蒜粘食

生麥門冬心去青竹茹各三兩 茅根五兩 甘草一兩 生薑五兩

去滓溫分三服如人行六七里進一服不吐利忌海藻松

菜
一
卷
中

備急療吐逆水米不下乾薑甘草湯方 乾薑二分甘草一分 右二味切以水二合煎取一合去滓頓

服則定少間與粥則不嘔神驗忌海藻松菜張文仲同出 延年人參飲主嘔不能食方 人參分厚朴吳橘皮各六 白朮 生薑各八 右五味切以水四大升煮

取一升五合分溫三服忌桃李雀肉等許孝廉處出 許仁則療嘔吐方四首

許仁則療嘔吐病有兩種一者積熱在胃嘔逆不下食一者積冷在胃亦嘔逆不下食二事正反須細察

之必其食飲寢處將息傷熱又素無冷病年壯力強膚肉充滿此則是積熱在胃致此嘔逆如將息食飲

寢處不熱又素有冷病年衰力弱膚肉瘦悴此則積冷在胃生此嘔逆若是積冷嘔逆經久急須救之不

爾甚成反胃病積熱在胃嘔逆不下食宜合生薑根五味飲服方 生薑根切生麥門冬許各一

生薑汁五苳苳 右藥切以水八升煮取二升半去滓加竹瀝六升合攪調分三服相去如人行十

里久始服一劑忌醋物 又依前生薑根等五味飲服之雖可然未能全除者宜合苳苳等五味丸服之方 苳苳五人參三麥門

冬一升生薑兩六青竹茹升 右藥搗篩蜜和為丸煎薑根飲下之初服十五丸日二服稍稍加至三

十九丸如梧子大忌醋物 又積冷在胃嘔逆不下食宜合半夏等二味丸服之方 半夏製小麥麴 右搗半夏為散以水

麴丸如彈子大以水煮令麴熟則是藥成初吞四五丸日二服稍稍加至十四五丸旋煮旋服服此覺

病減欲更重合服亦佳忌羊肉錫散 又依前半夏等二味丸雖覺漸損然病根不除欲多合前丸又慮毒藥不可久服欲不服藥又恐病滋蔓

宜合人參等七味丸服之方 人參 白朮各五生薑兩六厚朴吳細辛兩四橘皮兩三桂心兩二 右藥搗

篩為末蜜和為丸如梧子飲下之初服十九丸日二服稍稍加至二十九丸欲與前半夏丸間服亦得忌桃

半夏一汁 下家本三 真服州者 況去滑

亦佳八字 刺家下家 本有得可 欲重合服

亦佳八字

亦佳八字

亦佳八字

亦佳八字

李在肉生蔥生菜第一卷中

羅瘧嘔吐噦方三首

仲景傷寒論夫嘔家有癰膿者不可瘳也其嘔膿盡自愈若先嘔後渴者為欲解也先渴後嘔者為水停
在心下此屬飲家

嘔家本渴今反不渴者以心下有支飲故也此屬支飲仲景謂方此證當用小

嘔脈弱小便復利身有微熱見厥者難瘳四逆湯主之方 甘草二兩 附子一枚 乾薑一兩 右三物咀咀

以水三升煮取一升二合去滓溫分再服強人用大附子一枚乾薑三兩忌海藻菘菜豬肉

又嘔心下痞堅者大半夏湯主之方 半夏三升 人參切三兩 白蜜一升 右三味以泉水一斗二升并蜜和

揚之二百四十遍煮藥取二升半溫服一升日再服忌羊肉鵲本論治反

又乾嘔下利黃芩湯主之方 黃芩 人參各三錢 桂心二兩 大棗枚二 半夏洗半升 乾薑兩三 右六味切以水

七升煮取三升溫分三服忌羊肉鵲生蔥出第廿一卷中

噫醋方七首

病源噫醋者由上焦有停痰脾胃有宿冷故不能消穀穀不消脹滿而氣逆所以好噫而吞酸氣息酸臭

也出第廿一卷中

噫醋瘳吐酸水每食則變作醋水吐虫檳榔散方 檳榔計六人參 茯苓八 橘皮 華撥各六 石五

味搗篩為散平晨空腹取生薑五大兩合皮搗絞取汁溫內散方寸匕攪調頓服之日一服漸加至一

已半若到冬歲以微通洩為度忌酢物生冷油膩猪魚等

又瘳常吐酸水脾胃中冷茯苓湯方 茯苓 橘皮各分 白朮八 人參 桂心各六 甘草八分 紫蘇生

薑計二 檳榔枚 右九味切以水九升煮取二升半絞去滓分溫三服每服如人行七八里未好差三

兩日更服一劑老小取微利忌生葱酢物桃李雀肉海藻菘菜

枳字下家
本有合字
子碎四家

蠅字下家
本有人字

尚德按三
升要略作
二升
法字下家
本有全用
二字

枳字下家
本有破八
片三字

柳字下宋
本有八字

久字下宋
本有咸中
能服一時
能服一時
十四字
共字下宋
本有共合
紫也別持
作脂八字
當家本作

又噤嘔吐酸水時急藥心白木散方 白木 茯苓各八 吳茱萸各四 橘皮各六 華澄各四 厚朴各八 分橘柳各十 人

參各六 大黃各六 右九味搗篩為散空腹煮薑棗湯服方寸匕日二服漸加至二匕半覺熱服少飲食三

兩口壓之忌酢物桃李雀肉等

又療心頭結氣連胸背痛及吐酸水日夜不止茯苓湯方 茯苓 厚朴各四 橘皮 白木各二 生薑各十

右五味切以水九升煮取二升七合絞去滓分溫三服每服相去如人行七八里須利加橘柳末一兩

半湯欲熟時內之甚安穩三日服一劑頻服五六劑可則停忌酢物桃李雀肉等各一方有吳茱萸人卷

中

延年療食訖醋咽多噫吳茱萸湯方 吳茱萸各五 生薑各三 人參各二 大棗各十二 右四味切以水六升煮取

二升絞去滓分為三服每服相去十里久金並同付後分兩小別

又增損承氣丸療胸脅支滿背上時有一客熱則痛腹脹多噫醋咽氣逆兩脅滿並主之方 前胡 枳

實各七 桂心 乾薑 吳茱萸各五 茯苓各四 芍藥各六 厚朴各八 橘皮各十 大黃各六 杏仁各七 右十一

味搗篩為末內杏仁脂中所調篩度蜜和丸每服食後少時酒飲任性初服七丸如梧子以氣宣下洩

為度忌生葱大醋並出第十卷中

必效理中散主食後吐酸水食羹粥酪劇方 乾薑 食茱萸各二 右二味作散酒服方寸匕日三溫

服勿冷服之常醋水差新金同出卷中

尚德法全
有方七首
尚德法全
有方一十
七首

尚德法全
有方一十
二首

唐王養先生外臺祕要方卷七曰錄心痛心腹痛及

心痛方八首

諸蟲心痛方一十八首

惡症心痛方三首

心背微痛方四首

中惡心痛方五首

心下懸急懊痛方四首

久心痛方六首

腹痛方四首

心腹痛及脹滿痛方一十首

卒心腹脹滿方六首

腹內諸氣及脹不下食方一十一首

胸脇痛及妨悶方四首

胸膈氣方三首

寒症心痛方三首

七疝方三首

寒疝積聚方四首

九種心痛方三首

冷氣心痛方五首

心痛癰塊方二首

卒心痛方一十四首

多唾停飲心痛方二首

心痛不能飲食方二首

雜療心痛方三首

卒腹痛方七首

心腹脹滿及鼓脹方一十四首

腹脹雷鳴方三首

灸諸脹滿及結氣法二十二首

脇肋痛方二首

寒疝腹痛方九首

卒疝方三首

寒疝不能食方四首

心疝方四首

今
八
月
二
日
一
次
一

唐王壽先生外臺祕要方卷七

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞鼓院上護軍臣林億等 上進

新安後學程行道敬通父訂梓

門姪林雲來父全校

尚德接令
有方七首

心痛方八首

病源心痛者由風冷邪氣乘於心也其痛發有死者有不死者有久成瘥者心為諸藏主而藏神其正經不可傷傷之而痛為真心痛朝發夕死夕發朝死心有支別之絡脉其為風冷所乘不傷於正經者亦令心痛則乍間乍甚故成瘥不死

又心為火與諸陽會合而手少陰心之經也若諸陽氣虛少陰之經氣逆謂之陽虛陰厥亦令心痛其痛引喉是也又諸藏虛受病氣乘於心者亦令心痛則心下急痛謂之脾心痛也足太陰為脾之經與胃合引足陽明為胃之經氣虛逆乘心而痛其狀腹脹歸於心而痛甚謂之胃心痛也腎之經足少陰是也與膀胱合膀胱之經足太陽是也此二經俱虛而逆逆氣乘心而痛者其狀下重不自收持苦泄寒中為腎心痛也

診其心脉急者為心痛引背食不下

寸口脉沉緊苦心下有寒時痛

關上脉緊心下苦痛

左手寸口脉沉則為陰陰絕者無心脉也苦心下毒痛

備急療心痛方 桂心末溫酒服方寸匕須臾六七服乾薑依上法服之亦佳忘生葱文仲藥驗時後同出第一卷中

延年療心痛茱萸丸方 吳茱萸半兩 乾薑半兩 桂心半兩 白朮二兩 人參兩 橘皮兩 附子半兩 蜀椒出 汗甘

草一兩 黃芩一兩 歸身一兩 右十一味搗篩為散蜜丸一服五丸如梧子大日三服稍加至十五丸忌猪

肉生蔥海藻松菜桃李崔肉等盡更合酒飲無拘食前後任意肝後有桂梗一兩出第十五卷中

救急療心痛方 取驢糞絞取汁五六合及熱頓服立差肝後

人方 東引桃枝一握切以酒一升煮取半升頓服大效肝後同出第八卷中

必效療心痛方 當歸末酒服方寸匕頻服肝後同出仲文

人方 生油半合溫服差肝後備急張文仲同並出第五卷中

古今錄驗療心痛黃連湯方 黃連肝後 右一物吹咀以水七升煮取一升五合飯去滓適寒溫飲五合

日三服忌猪肉冷水肝後范汪同出第八卷中

九種心痛方三首

廣濟療九種心痛蛔蟲冷氣先從兩肋胸背撮痛飲變吐當歸鶴蟲散方 當歸 鶴蟲各八分 橘皮 人

參各六分 檳榔分二 枳實 吳茱萸各六分 桂心分五 右八味搗篩為散空腹煮薑棗飲服方寸匕日二服漸

加至一匕半不利忘生蔥生冷物油膩粘食出第四卷中

千金療九種心痛一蟲心痛二注心痛三氣心痛四悸心痛五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛九

去來心痛慈主之并療冷衝上氣落馬墮車附子丸方 附子炮一兩 已豆仁一兩去心皮 人參一兩 生狼毒一分

極食茱萸而乾薑而 右六味搗末蜜和空腹服如梧子三九一日一服弱者二九卒中惡心痛口不

能言連年積冷流注心胸痛者亦服之好好將息神效忘野猪肉蘆薈心必致同

人療九種心痛方 取當大歲上新生槐枝一握去兩頭水三升煮一升頓服之並出第十卷中

諸蟲心痛方一十八首

廣濟療諸蟲心痛無問冷熱蛔蟲心痛檳榔鶴蟲散方 當歸 桔梗 芍藥 橘皮 鶴蟲各八分 人參

桂心各六分 檳榔分二 右八味搗篩為散空腹煮薑棗湯服方寸匕漸漸加至二匕不利忌猪肉生蔥油

膩小豆粘食等

尚德按千金附子乾薑各二兩生狼毒四分作吳茱萸服法亦小

人壽如蟲心痛相并及不差方
酒中須服之是無所忌
若酒至令就青錢二文令其安酒中則服雞子白一顆去却錢湯著

又主心腹絞痛不止仍以有烟蟲者當歸湯方
當歸 細辛 甘草炙 生薑各四 大黃八分
雞蘇 若七味切以水六升煮取二升分溫三服如人行四五里進一服不利未差三日更作服之

忌酒蒜生生菜取生酒中
小品溫中當歸湯海寒冷心腹刺痛面黃肉少平出飲霍亂吐下脈沉細者及傷寒毒冷下清水變作

青白帶下及白帶後是後下清水者此方可以調諸冷痛也
當歸 人參 乾薑 茯苓 厚

朴 青木香 桂心 結梗 芍藥 甘草炙 右十味切以水八升煮取三升分溫三服日三服

不射青木香者以犀角一兩代之也海寒冷者給肉蠟物生薑等

又凡心腹絞痛相引者海寒冷如物從腹觸其身似寒者腎心痛也

厥心痛如錐刺其心心痛甚者脾心痛也

厥心痛色蒼如死在腹不得太息者肝心痛也

厥心痛心若結者肺動作痛甚色不脫肺心痛也

真心痛手足青至肘心痛甚旦發夕死夕發旦死

心腹中痛發作腫聚往來上下痛有休止腹中熱喜涎出是蛇蟲咬也出甲乙經第一卷中
千金瘰癧心腹中痛發作腫聚往來上下痛有休止多熱喜涎出是蛇蟲咬也並宜溫中當歸湯服兩三劑
後若不效有是宜改方增損湯其品中當歸為在前小品方中此是增損湯方
芍藥 黃芩 厚朴 結梗 柴胡 各四 當歸 升麻 各三 右七味切以水八升煮取二升半分三服忌豬肉出第十卷中
張文仲於心腹絞痛散方 鴉卵二分末溫酒一盞和服之出第十卷中

向德按十
全為藥
而厚朴作

高徒按
當當作

乾桑丸方 乾桑葉搗蜜和丸服十五丸日再服急

又方 取槐上木耳燒灰末如粟大正發和水服若不止飲熱水一升蛔蟲立出必效方云酒下服急

又方 發時取鹽一匙內口中水下三匙蟲即出

又方 取時取鹽一匙內口中水下三匙蟲即出

又方 取時取鹽一匙內口中水下三匙蟲即出

又方 取時取鹽一匙內口中水下三匙蟲即出

又方 取時取鹽一匙內口中水下三匙蟲即出

又方 取時取鹽一匙內口中水下三匙蟲即出

又方 取時取鹽一匙內口中水下三匙蟲即出

又方 取時取鹽一匙內口中水下三匙蟲即出

又方 取時取鹽一匙內口中水下三匙蟲即出

又方 取時取鹽一匙內口中水下三匙蟲即出

又方 取時取鹽一匙內口中水下三匙蟲即出

又方 取時取鹽一匙內口中水下三匙蟲即出

又方 取時取鹽一匙內口中水下三匙蟲即出

又方 取時取鹽一匙內口中水下三匙蟲即出

又方 取時取鹽一匙內口中水下三匙蟲即出

又方 取時取鹽一匙內口中水下三匙蟲即出

又方 取時取鹽一匙內口中水下三匙蟲即出

又方 取時取鹽一匙內口中水下三匙蟲即出

又方 取時取鹽一匙內口中水下三匙蟲即出

據師為散工腹者蜜飲服方寸匕日二服加至一七半不利忌生葱猪肉酢物桃李雀肉等

深師療胸滿短氣心痛吐涎虛冷防風茯苓湯方 防風 茯苓 桂心 甘草 半夏 乾薑

崔氏療心痛與冷氣痛者特相宜烏頭丸方 烏頭 附子 赤石脂 蜀椒 干桂心 乾薑

右心物搏締蜜和為丸痛發時溫清酒服三丸如梧子覺至痛處痛則止若不止加至五六丸以知為

度若早朝服無所覺至午時又服三九此方丹陽有隱士出山云得華陀法其療略同若久心痛每旦

服三九稍加至十九盡一劑遂終身不發忌生葱猪肉

延年療冷氣久刺心痛不能食方 當歸 桂心 桔梗 吳茱萸 人參 白朮 高良薑

皮江 右八味搏締為散蜜和為丸如梧子大一服十九酒下日二服加至十五二十九為度忌生葱

桃李猪肉雀肉等

又療心痛冷痛腹滿如錐針刺及蟲嚙心痛當歸湯方 當歸 桔梗 吳茱萸 桂心 芍藥 大

黃芩 右六味切以水六升煮取三升三合去滓內鴈卵一兩攪溫一沸分三服空腹服之微利為

度忌猪肉生葱

惡症心痛方三首

廣濟療惡症撮肋連心痛當歸湯方 當歸 青木香 枳實 厚朴 麝香 右四味切以小便一大

升半煮取六六合絞去滓下麝香末分溫三服服別如人行四五里進一服微微利忌生菜麵猪犬肉

粘食蒜陳臭物

崔氏療症在心腹痛不可忍方 取東引桃枝削去蒼皮取白皮一握以水二大升煮取半升一服令盡

則差如不定更依前服之無忌

尚德按要
略分兩與
此不同服
法亦小異

久療心腹痛不可忍似症病者或暴得惡症實刺欲死桃仁大黃湯方 鬼前羽二桃仁六十枚芍藥四

鬼田二兩橘皮二兩當歸各二生薑五兩桂心二兩柴胡各二砂礪二兩腐香一兩成下二兩朴硝二兩大黃

別三兩右十三味切以水九升急火煮取三升溫分三服如人行相去六七里服但得快利三四行必

差忘生薑生血物並出第

心痛痲塊方二首

廣濟療心痛痲塊硬莖心氣欲絕當歸湯方 當歸 桔梗 芍藥 枳實 厚朴 針分 橘皮 八人 參 於高良

薑 針桃仁五十枚生薑八右九味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服服別相去如人行六

七里進一服不利忌猪肉生冷油膩雞魚粘食小豆大蒜並出第

張文仲療心下堅痛大如椀邊如旋稜並名為氣分水飯所結方 枳實七枚白木三右二味切以水

一斗煮取三升分三服腹中軟即當散也忌桃李雀肉等此張仲景傷寒論方備

心背微痛方四首

仲景傷寒論心痛微背背痛微心為頭赤石脂丸主之方 烏頭二分炮附子一分炮赤石脂二分乾薑四分

蜀椒一分右五味搗篩蜜和丸先食服如麻子大一服三九少少加之忌猪肉冷水並出第

同出第十五卷中

張文仲蜀椒丸療胸中氣滿心痛引背方 蜀椒一升半夏一升附子一兩右三味搗篩蜜和為丸如

梧子大一服五九日三忌猪羊肉錫等並出第

芫花療心下切痛引背胸下蓄氣胃中有宿食寒食煎方 芫花黃升蜀椒五甘草二兩乾地黃一斤右

四味以清酒三升漬三宿絞取汁銅器中煎令沸麥門冬五升去心乾漆一斤內煎中色黃絞去之內

石斛五兩阿膠一斤白蜜六升凡九味以湯煎令可丸取如棗大含稍稍咽之日三甚者日五六服

輕重痛者加石斛少氣加麥門冬服藥五日愈當下腹忌海藻薤菜蕪薹等並出第

又先花湯至平心痛連背背痛微心心腹並痛如鬼所刺絞急欲死者方 芫花汁大黃汁 右二味
搗下篩取四方寸匕著二升半苦酒中合煎得一升二合頓服盡須臾當吐吐便愈者小從小起此藥
強實人良若虛冷心痛忌服卷中

卒心痛方一十四首

肘後療卒心痛方 先煮三沸湯一升以鹽一升合攪飲之若無火以作湯仍可用鹽水或半升服之同錄

同錄

又方 吳茱萸二升薑切 豉一升 酒一升 右四味煮取二升半分三服

又方 白艾成熟者三升以水三升煮取一升去滓頓服若為客氣所中者當吐蟲物出范江

又方 取竈下熟灰歸去炭分以布囊盛令灼灼爾更番以熨痛上冷者更熱令熱

又桂心散方 桂心 當歸各一兩 梔子仁枚十四 右三味搗為散酒服方寸匕日三五服亦主久心痛發

作有時節者忌生蔥

又桂心丸方 桂心雨烏頭地一兩 右二味搗篩蜜和為丸如梧子服三丸稍增之忌生蔥豬肉

又療暴得心痛如刺苦參湯方 苦參 龍膽 升麻各二兩 梔子仁三枚 石四味切苦酒五升煮取一升

分二服當大吐乃差並出第

集驗卒心痛桂心湯方 桂心雨 右一味以水四升煮取一升半分二服忌生蔥時後范注千金

張文仲療卒心痛方 取敗布裏鹽如彈子燒令赤末以酒一杯和服之時後備急中

又方 閉氣忌之數十過并以手大搗按心下宛宛中取差時後備急

又方 苦酒一升破雞子一枚著中含攪飲之好酒亦佳時後備急

又方 薤大豆 者之以薤皮更苦熨心上冷復易之時後備急

救急療卒心痛不能起止方 升麻水二升大蜜半 右二味相和婦人患令男子度與飲男子患令婦人

度與飲必愈卷八

必效療卒心痛人參湯方 人參 桂心 梔子 黃芩 甘草各一兩 右五味切以水六升煮取二升

分三服則愈可效忘海藻菰菜生葱附後同出 藥五卷中

中惡心痛方五首

廣濟療卒中惡心腹絞刺痛氣急脹奮欲絕瓜蒂散方 雄黃四兩 赤小豆四兩 瓜蒂三 右三味搗

篩為散空肚溫漿水服一錢匕半當吐止不吐加至兩錢匕忌生冷油膩粘食陳臭等

人療卒中惡心腹刺痛去惡氣辟香散方 麝香一分 生犀角二分 青木香一分 右三味搗篩為散空肚

以熱水服方寸匕立愈未止更服之不利忌五辛並出第 四卷中

集驗療卒暴心痛或中惡氣毒痛不可忍方 大黃 芍藥各四兩 升麻 黃芩 鬼箭各三 鬼白 桂心

各二兩 桔梗三兩 柴胡四兩 砂礞石二兩 朴硝二兩 右十一味切以水九升煮取二升七合分三服先分硃砂作

三分一服內一分攪硃砂調服之此湯快利若痛不止宜服後方忌猪肉生葱生血物千金云寒氣在 客於五臟六腑

中則發心痛 方千金同

又方 赤芍藥六兩 桔梗五兩 杏仁五兩 去於皮 右三味切以水六升煮取二升半分三服日三忌肉猪千金同 出第一

中卷

千金療卒中惡心痛方 苦參三兩 好醋一升 右二味以醋煮苦參取八合強人頓服老小二服世第 三

中卷

多唾停飲心痛方二首

病源心痛而多唾者停飲乘心之絡故也停飲者水液之所為也心氣通於口心與小腸合俱象火小腸

心之腑也其水氣下行於小腸為澁便則心絡無有停飲也膀胱與腎俱象水膀胱為腎之腑主藏津液

腎之液上為唾腎氣下通於陰若脾臟和平則水液下流宣利若冷熱相乘致脾臟不調津液水飲停積

尚德按：此方中
千金作中
又按：四千
金作六

尚德按：此方中
千金作中
又按：四千
金作六

尚德按：此方中
千金作中
又按：四千
金作六

尚德按：此方中
千金作中
又按：四千
金作六

尚德按：此方中
千金作中
又按：四千
金作六

尚德按：此方中
千金作中
又按：四千
金作六

尚德按：此方中
千金作中
又按：四千
金作六

尚德按：此方中
千金作中
又按：四千
金作六

尚德按：此方中
千金作中
又按：四千
金作六

尚德按：此方中
千金作中
又按：四千
金作六

上迫於心，心氣不宣暢，故痛而多唾也。六卷第十

范汪療胸中寒熱，心痛清唾滿口，數飲吐食不化，乾薑九方。乾薑、桂心各一，礬石一分，煎半復。

蜀椒分各一 右五味，搗篩蜜和丸，如大豆，許服二九，日三，不知稍加，以知為度。忌生蔥、羊肉、鰓。八卷中

集驗療心痛，唾多似蟲者，方取六畜心，隨得生切，作四瓣，刀縱橫各一割破之，內少真硃砂，著中，平旦

吞之，蟲死愈矣。無真硃砂，可用雄黃麝香也。中時從云切作十四，當刀縱橫各割之，以真丹一兩，粉內割。

通按：生食果安否？

心下懸急，懊痛方四首

病源：心與小腸合為表裏，俱受於火，而火為陽氣也。心為諸藏主，故正經不受邪。若為邪所傷而痛，則死

若支別絡為風邪所乘而痛，則經久成疹，其痛懸急，懊者是邪迫於陽氣，不得宣暢，擁瘀生熱，故心如懸

而急，煩懊痛也。此第十

仲景傷寒論：心下懸痛，諸逆大虛者，桂心、生薑、枳實湯主之。方：桂心、生薑各三、枳實五枚、右三味

切，以水六升，煮取三升，去滓，溫分三服，忌生蔥。范王同出十五卷中

肘後薑附丸方：附子二兩、乾薑一兩、右二味，搗篩蜜和丸，如梧子，服四九，酒飲，並得日三服，忌豬肉、冷

水。本方云：治心膈傷，動。

古今錄驗：療人心痛，懊惱，懷悶，閉塞，引兩乳，又或如刺，因極，桂心湯方。通按：情音。桂心兩、茱萸二、芍藥兩

三當歸兩、生薑半斤、無生薑以乾薑五兩代之。右五味，切以水一斗二升，煮取四升，服一升，晝三夜一，良有驗。忌生

蔥。出第八卷中

千金：心下痞，諸逆懸痛，桂心三物湯主之。方：桂心兩、膠飴半斤、生薑二兩、右藥切以水四升，煮二味，取三

升，去滓，內飴，分三服，忌生蔥。出第十卷中

心痛不能飲食方二首

心下懸急，懊痛方四首：心痛不能飲食方二首

病源心痛而不能飲食者積冷在內客於脾而乘心絡故也心陽氣也冷陰氣也冷乘於心陰陽相乘冷熱相擊故令痛也脾主消水穀冷氣客之則脾氣冷弱不勝於水穀也心為大脾為土是母子也俱為邪所乘故痛復不能飲食也出第十卷中

廣濟療久心刺肋冷氣結痛不能食高良薑湯方 高良薑 當歸各十 橘皮八 厚朴八 枳梗八 桃仁五 吳茱萸 生薑各八 訶梨勒五 右九味切以水八升煮取二升八合絞去滓分溫三服服別

相去如人行六七里再服忌豬肉生冷油膩粘食小豆等出第四卷中

肘後療常患心痛不能飲食頭中疼重烏頭丸方 烏頭六分 椒六分 乾薑 桂心 附子 右四味搗末蜜

丸酒服如大豆四丸稍稍增之忌生葱出第一卷中

久心痛方六首

病源心為諸藏主其中經不可傷傷之而痛者則朝發夕死夕發朝死不暇展療其人心痛者是心之支別絡為風邪冷氣所乘痛也故成疹不死發作有時經久不差也出第十卷中

廣濟療心痛三十年不差月上旬殺蟲雷丸鶴龜散方 雷丸 鶴龜 貫眾 狼牙 桂心 當歸

橘柳各八 右七味搗篩為散空腹煮蜜水半雞子許服方寸匕日二服若重不過三服則差不利忌

生蔥生冷油膩鰭魚小豆大蒜等出第四卷中

范汪療久心痛烏頭赤石脂丸方 赤石脂 乾薑 桂心 椒 汗 烏頭 炮 右五味等分末之蜜和丸

如梧子服三丸日三以知為度赤石脂當取斑斑赤中者忌豬肉冷水生葱出第十卷中

必效療三十年心痛方 桃仁七枚 右一味研湯水合蠅服酒服亦良出後經心經同

古今錄驗療久心痛腹痛積年定不過一時間還發發其則數日不能食又便出乾血窮天下方不差甄

立言為處犀角丸服之數日則差方 犀角二分 麝香二分 硃砂四分 枳梗八 莽草二分 鬼臼二分 附子

地二分 桂心二分 貝齒五分 甘草六 芫花二 已豆二十枚 赤足蜈蚣二枚 右十三味搗篩蜜和丸如梧

子二分

子二分

子二分

子二分

尚德按人
病源作久

尚德按又
字疑行

尚德按又
疑當作又

尚德按又
疑當作又
當作柱

子飲服一丸旦漸加至三丸以利為度忌生薑猪肉野猪肉蘆笋生血物一方無附子千金有雄黃二分出第八卷中

療心痛如蟲噬痛宛轉欲死不救方 又寒搏地黃汁和麴作冷淘不用鹽服一頓蟲即出不出再服必

出便差正元十年通事舍人崔抗女患心痛垂氣欲絕忽記此方服便吐出一物可方一寸以來狀如

蝦蟇無目足微似有口蓋破此物所蝕抗云往年見親表患心痛因偶食地黃飢飽遂吐一蟲猶動其

時亦不謂地黃冷淘能害此蟲因盛於小竹筒以數莖地黃冷淘投於竹筒中須臾視之已化為水然

覺此冷淘殺蟲心痛無不永絕抗自得此方救三四人皆如神效出手抄方

經心錄療四十年心痛不差方 黍米瀝汁溫服隨多少出第一卷中

雜療心痛方三首

廣濟療心痛又心撮助心悶則吐血手足煩疼食飲不入桃仁丸方 桃仁八分去當歸六分芍藥八分梨

勒六分甘草六分延胡索八分人參六分檳榔十枚右八味搗篩蜜丸如梧子以酒空腹下二十九丸漸加至

三十丸日再服取快利忌海藻菰菜生菜薤蕎麥猪犬肉粘食出第四卷中

古今錄驗真心痛證手足青至節心痛甚者旦發夕死夕發旦死療心痛痛及已死方 高其枕柱其膝

欲令腹皮感柔爪其臍上三寸胃管有頃其人患痛短氣欲令人舉手者小舉手問痛差緩者止出第八卷中

中

救急療心痛冷熱方 取伏龍肝末煮水服方寸匕若冷以酒和服差出第八卷中

腹痛方四首

病源腹痛者由臍藏虛寒冷之氣客於腸胃募原之間結聚不散正氣與邪氣交爭相擊故痛其有冷氣

搏於陰經者則腹痛而腸鳴謂之寒中是陽氣不足陰氣有餘者也診其寸口脉沉而緊則腹痛尺脉緊

臍下痛脉沉遲腹痛脉來觸觸者少腹痛脉陰弦則腹痛凡腹急痛此裏之有病其脉當沉若細而反浮

大故當愈矣其人不即愈者必當死以其病與脉相反故也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

內急按
字上病源
有治字

尚德按黃
字下疑脫
湯字

尚德按十
金吳萊英
二升餘與
小品同注
文可疑

尚德按注
時後作注

養生方導引法云腹脰手臂痛法屈一脰臂中所痛者正偃卧口鼻閉氣腹痛以意推之想氣往至痛上
俱熱即愈又云偃卧展兩脰兩手仰足指以鼻內氣自極七息除腹中弦急切痛又云偃卧口內氣鼻出
之除裏急飽咽氣數十令溫中寒乾吐嘔腹痛口內氣七十所大振腹咽氣數十兩手相摩令熱以摩腹
令氣下上篇下
六卷中

張文仲當歸大黃療冷氣牽引腰背肋下腹內痛方 當歸三芍藥八桂心三乾薑六萊菔五人參大

黃略一甘草二兩 右八味切以水六升煮取三升去滓溫服一升日三忌海藻菰菜生葱出第三
卷中

范黃四味當歸湯主寒腹痛方 當歸 桂心 乾薑略三甘草二兩 右切以水八升煮取三升一服

一升日三服虛冷微痛甚者加黃耆與藥各二兩忌海藻菰菜生葱千金與甘草有附子
兩出第十五卷中

小品療寒冷腹痛萊菔湯方 吳萊菔二甘草八人參 桂心略一生薑五半夏一小麥升當歸二右

八味切以水一斗五升煮取三升分溫服一升日三服忌海藻菰菜羊肉錫小葱一千金桂二兩生薑切
一升出第一卷中

古今錄驗芎藭湯療卒寒腹中拘急痛方 芎藭 當歸 桂心 芍藥 甘草一兩各黃芩兩乾薑兩杏

仁三十枚
去皮炙 右八味切以水五升煮取二升分再服忌海藻菰菜生葱出第八
卷中

卒腹痛方七首

肘後療卒腹痛方 粳米仁 右一味以水六升煮取六七沸飲之

又方 掘土作小坎以水滿坎中熟攪取汁飲之差一並出第
一卷中

張文仲療卒腹痛方 令病人卧高枕一尺許柱膝使腹皮跟氣入胸令人爪其臍上三寸便愈能乾咽

吞氣數十過者彌佳亦療心痛肘後備
急同

又方 灸兩足指頭各十四壯使火俱下良備急肘後同並
出第一卷中

千金療胸腹中卒痛生薑湯方 生薑取斤許食鹽八兩酢四 右三味微火上熱令相得適寒溫服三

合同三出第十
六卷中

尚德按痛
痛滿
序痛

集驗驗卒肌痛萬氏方 桂末三七酒服人參上子氣薑亦佳忌生蔥

又方 食鹽一大把多飲水送取吐

心腹痛及脹滿痛方一十首

病源心腹痛者由脾臟虛弱風寒客於其間故也邪氣發作與正氣相擊上衝於心則心痛下攻於腹則腹痛上下相攻故心腹絞痛氣不得息勢其脉左手寸口人迎以前脉平少陰經也沉者為陰陰虛者病苦心腹痛難以言心如寒狀心腹痛痛不得息脉細小者生大堅疾者死心腹痛脉沉細小者生浮大而疾者死其湯熨針石別有止方補養宣導令附於後養生方導引法云行大道常度日月星辰清靜以難鳴安身卧飲口三咽之調五藏飲食靈令人長生療心腹痛

廣濟療心腹中氣時時痛食冷物則不安穩及惡水桔梗散方 桔梗 茯苓 枳實 人參 厚朴

又芍藥 橘皮 桂心 枳實 麥門冬 右十味搗篩為散空肚煮薑棗飲服方寸匕日三

服漸加至一匕半熟以茶飲下不利忌豬肉酢物生蔥生油膩小豆粘食麴炙肉等物

又療心腹脹滿不下食飲得瀉三兩行佳當歸湯方 當歸 茯苓 桔梗 橘皮 高良薑

檳榔 生薑 右七味細切以水七升者取二升三合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七

里服訖利三兩行宜停後服忌豬肉酢物生油膩魚蒜粘食小豆

肘後療心腹俱脹痛煩滿短氣欲死或已絕方 梔子 枳實 右二味以水二升先煮枳取一升二

合去滓內梔子更煎取八合絞去滓服半升不愈者盡服之

又方 烏梅二七枚水五升煮一沸內青大錢二七文煮取一升半強人可頓服贏人分再服當下愈

又方 葶藶二升生薑切四兩 右三味酒四升煮取二升分三服即差

又療心腹間連常脹痛狼毒丸方 狼毒 附子 雄黃 右二味搗篩蜜和丸服如梧子一日服一丸

又療心腹間連常脹痛狼毒丸方 狼毒 附子 雄黃 右二味搗篩蜜和丸服如梧子一日服一丸

又療心腹間連常脹痛狼毒丸方 狼毒 附子 雄黃 右二味搗篩蜜和丸服如梧子一日服一丸

又療心腹間連常脹痛狼毒丸方 狼毒 附子 雄黃 右二味搗篩蜜和丸服如梧子一日服一丸

二日一丸三日三丸自一至三以為常服即差忌猪肉冷水

又方 吳茱萸一分 藜蘆一分 附子二分 細辛一分 人參一分 右五味搗末蜜和丸如梧子服五丸酒飲並得日

三忌猪肉生菜等一卷中

深師唐久寒冷胸膈滿心腹絞痛不能食忽氣吸吸不足前胡湯方 前胡一斤 脂二斤 大棗二十 當歸

茯苓 白朮各一斤 芍藥一斤 桂心一斤 半夏一斤 乾薑一斤 麥門冬六分 吳茱萸三斤 右十二味切以水八升

煮取三升分三服相去如人行十里進一服忌酢物生葱羊肉鵲桃李雀肉等六卷中

小品當歸湯療心腹絞痛諸虛冷氣滿方 當歸三斤 乾薑四斤 甘草二斤 芍藥二斤 厚朴三斤 黃芩二斤 蜀椒一斤

汁半夏一斤 肉桂一斤 人參三斤 右十味切以水一斗煮取三升二合強人可一升羸人服八合大冷者

加附子一枚 炮忌海葶苈菜羊肉鵲生葱古今錄驗

古今錄驗通命丸療心腹積聚寒中絞痛又心迫滿脅下脹痛方 大黃 遠志去心 黃芩 麻黃去心 甘草

各四兩 芒硝三兩 杏仁六十枚 鼓二枚 豆五升 去心為脂 右九味搗合下篩蜜和丸如梧子大先食飲服

三九日三忌野豬肉蘆葦海葶苈菜卷中

心腹脹滿及鼓脹方一十四首

病源心腹脹者藏虛而邪氣客之乘於心脾故也足太陰脾之經也脾虛則脹足少陰腎之經也其脉起

於足小指之下循行上絡膀胱其直者從腎上入肺其支者從肺出絡於心臟虛邪氣客於二經與正氣

相搏積聚在肉氣并於脾脾虛則脹故令心腹煩滿氣急而脹也診其脉遲而滑者脹滿也其湯熨針石

別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云伸右脛屈左膝內壓之五息引脾去心腹寒熱胸臍邪

脹依經為之引脾中熱氣出去心腹中寒熱胸臍中邪氣脹滿久行之無恙寒熱時節之所中傷名為真

人之方出第十卷中

廣濟療心腹脹滿臍下塊硬如石疼痛不止芍藥丸方 芍藥 當歸 白朮 鼈甲八分 訶黎勒去核

尚優按此
痛源作有

乾薑 人參 各六分 雄雀屎 各四分 郁李仁 十分 右十味 搗篩蜜和為丸如梧子大空肚以酒下

二十九漸加至三十九日再服不吐不利忌生菜茹葱薤桃李雀肉蒜粘食等物

又療腹脹氣急衝心艱痛鼈甲丸方 鼈甲炙芍藥 枳實炙人參 檳榔 各八分 訶黎勒 大黃 各六分

心如橘皮 分 右九味搗篩為末蜜和為丸空肚以酒服如梧子大二十九漸加至三十九日二服微

利為度忌生葱薤菜炙肉蒜麴等

又療腹脹氣急通草湯方 通草 茯苓 元參 桑白皮 白薇 澤瀉 各三分 人參 郁李仁 舂澤漆

葉 升切一分 右九味切以水一斗煮取三升去滓分溫四服服別相去如人行六七里進一服不利忌麴

油膩酢粘食等

又療腹脹上下腫心腹堅強喘息氣急連陰腫坐不得仍下赤黑血汁日夜不停者茯苓湯方 茯苓 二兩

防己 半兩 橘皮 元參 各一分 黃芩 澤瀉 各半兩 杏仁 二兩半 白朮 半兩 大豆 半升 郁李仁 桑白皮 各二兩

半兩 澤漆葉 升切一分 豬苓 半兩 右十三味切以水一斗先煮桑白皮大豆澤漆葉取五升去滓澄去下淀

內諸藥煎取二升絞去滓分三服服者加五味子二兩停二日服一劑忌酢物桃李雀肉麵蒜炙肉粘

食油膩等 防己一云茯苓神

又療患久心痛腹滿并痰飲不下食人參丸方 人參 白朮 枳實 各六分 茯苓 八分 厚朴 炙青木香 各六分

橘皮 炙大黃 檳榔 各六分 右九味搗篩蜜和丸空腹煮生薑棗湯下如梧子二十九日二服漸加至

三十丸不利忌酢物桃李雀肉等

又療心腹脹滿柴胡厚朴湯方 柴胡 厚朴 炙 各六分 茯苓 橘皮 紫蘇 各八分 生薑 二分 檳榔 五分

右七味切以水七升煮取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里進一服微利忌酢物

生冷油膩粘食

又療心腹脹滿腹中有痛水連雨助滿悶氣急衝心坐不得郁李仁丸方 郁李仁 八分 牽牛子 六分 甘遂

心腹脹滿及腹脹方一十四首

尚德按乾
薑十金作
生薑要
又按並疑
雷作出

分四防葵_二薑_三蘭子 桑白皮 檳榔_四橘皮 澤瀉_五茯苓_六 澤漆_七葉_八杏仁_九 右十

二味_一檳榔蜜和丸空肚飲服如梧子五九日二服服到十丸微利為度忌酢物生冷油膩麵炙肉蒜等

又療患氣發心腹脹滿兩肋氣急紫蘇湯方 紫蘇_一訶梨勒皮_二當歸_三生薑_四八人參_五橘柳_六生

地黃汁_七 右七味切以水六升煮六味取二升絞去滓下地黃汁分溫三服服別如人行四五里溫

進一服利三兩行忌薑蔥生菜麵炙肉魚蒜粘食陳臭等_二 並出第

深師療腹脹滿胸膨逆害飲食熱不得卧流汗厚朴湯方 厚朴_一炙桂心_二芍藥_三半夏_四枳實_五 右

甘草_六 二兩 麥門冬_七 四兩 黃芩_八 兩 乾薑_九 兩 右九味切以水一斗煮取二升半絞去滓服八合日三小便

難如木三兩人參四兩忌生蔥海藻_一菰菜_二羊肉_三 右三味切以水七升煮取二升

千金厚朴七味湯主腹滿氣脹方 厚朴_一半斤 甘草_二炙大黃_三各三 枳實_四桂心_五乾薑_六 右切

以水一斗煮取五升去滓內大黃取四升服八合日三嘔者加半夏五合利者去大黃寒加生薑至半

斤忌海藻菰菜生蔥羊肉_一 右三味切以水七升煮取二升

集驗療肚滿有氣心腹脹中冷半夏湯方 半夏_一升 桂心_二四兩 生薑_三八兩 右三味切以水七升煮取二升

絞去滓通寒溫飲七合忌羊肉_一 右三味切以水七升煮取二升

古今錄驗消化丸療人腹脹心滿腸胃結食不消化嘔逆頭痛手足煩疼此方出太醫院藥常用芫花丸

方 芫花_一熱_二兩 大黃_三 葶藶子_四 乾甘遂_五 黃芩_六 各二 巴豆_七 四枚 硝石_八 一兩 右七味_九 檳榔_十 合蜜和丸如

梧子先食服三九日再服一方無硝石忌野豬肉蘆筍等_二 並出第

必效青木香丸主氣滿腹脹不調不消食兼冷方 青木香_一 檳榔_二 各六 大黃_三 各二 芍藥_四 訶梨勒_五 枳

實_六 各桂心_七 右七味_八 檳榔_九 蜜和丸如梧子飲服十五丸漸漸常加以利為度不限丸多少不利者

乃至五十六十九亦得忌生蔥_一 並出第

又療腹脹滿堅如石積年不損者方 取白楊東南枝去蒼皮護風細剉五升熬令黃酒五升淋訖則以

絹袋盛滓還內酒中密封再宿每服一合日三

並出第
二卷中

卒心腹脹滿方六首

肘後療卒心腹煩滿方 劉薏苡根濃煮取汁服三升

又方 黃芩兩一杏仁二十枚牡蠣一兩右三味切以水三升煮取一升頓服之

又方 灸兩手大拇指內邊爪後第一文頭各一壯又灸兩手中央長指下一壯愈肘後此方本
治卒心腹

尚書按
時後作案

此本在雜療中其病亦是痰飲霍亂之例兼宜依霍亂條中法療之人平居有患者亦少皆因他病兼為
之耳或從傷寒後未復或從霍亂吐下後虛躁或是勞損服諸補藥痞滿或觸寒熱邪氣或食飲協毒或
服藥失度並宜各循其本源為療不得專用此法也並出第
一卷中

備急療卒心腹脹滿又胸脅痛欲死方 熱煮湯令灼灼爾以漬手足冷則易秘之肘後張
文仲同

又桂心散方 枳實炙桂心 右二味等分下篩以米汁服一匕忌生蔥肘後張文仲同
並出第一卷中

救急療卒患心腹脹滿刺痛方 生薑大有功能遠行宜將自隨煮汁服良患久痢虛損嘔逆不下食見

食則吐取三兩細切搗絞取汁微煖點少多蜜頓一服則下食大效並出第
七卷中

腹脹雷鳴方三首

范汪療腹中寒氣脹雷鳴切痛胸脅逆滿附子粳米湯方 附子一枚半夏升甘草炙大棗十枚粳米

升 石五味切以水八升煮米取熟去米內藥煮取三升絞去滓適寒溫飲一升日三忌海藻菰菜豬

羊肉錫仲案傷寒論同集驗加
黃二兩並第十五卷中

延年療意腹內氣脹雷鳴胸背痛方 丹參 枳實炙各桔梗 白朮 芍藥各二生薑四橘榔各右

七味細切以水九升煮取二升七合去滓分溫三服忌豬肉桃李雀肉生冷油膩魚蒜等並出第
十卷中

又丹參治療腸鳴則覺作聲方 丹參 茯苓各三桔梗兩生薑兩細辛 厚朴炙食茱萸各二右

七味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服每服如人行七八里忌生蔥豬肉酢物並出第
四卷中

腹內諸氣及脹不下食方十一首

腹內諸氣及脹不下食方十一首

唐濟瘕腹內諸氣脹滿昆布散方 昆布 海藻 人參 元參 橘皮 升麻 各三兩 藟 桂心 乾

薑 各二小麥 之一 痛止 右十味搗篩為散別搗小麥作散合藥散一處更搗千杵酒服方

寸匕日三服漸加至二寸匕不利忌熱麵炙肉生蔥蒜粘食物等

又療冷氣薏苡仁飯粥方 細代薏苡仁炊為飯氣味欲勻如麥飯煮粥亦好豉漿粥並任意無所忌

又療氣蘇子粥方 蘇子不限多少研如麻子作粥依食法著蔥豉薑並得無所忌

又療氣膀胱急妨宜下氣方 薑黃 搗和食鹽末令調以綿裏如棗大內下部久時或下惡汁并下氣佳

無所忌 通淋快急妨小便

又療氣昆布腫法 高麗昆布一斤白米泔汁浸一宿洗去鹹味以水一斗煮令向熟摩長三寸闊四五

分仍取蔥白一握二寸切斷擘之更合熟煮令昆布極爛仍下鹽酢豉糵調和一依腫法不得令鹹酸

以生薑橘皮椒末等調和宜食粳米飯粳米粥海藻亦依此法極下氣大效無所忌

又療心頭冷硬結痛下氣柳柳湯方 柳柳新生薑 青木香 各三兩 橘皮 枳實 炙甘草 炙 大黃 各二

右七味切以水六升煮取二升半絞去滓分溫三服服別如人行四五里進一服取微利忌生菜熱麵

又內海藥松葉等

又療一切氣妨悶不能食柳柳丸方 柳柳餅芍藥 各五兩 枳實 七枚 人參 五兩 大黃 針六 青木香 各六 桂心 各

右七味搗篩蜜和丸空腹服如梧子二十九日再服漸加至二十五丸微洩為度忌生菜熱麵炙肉蒜

粘食生蔥等物

又療氣小芥子酒方 小芥子一升搗碎以絹袋盛好酒二升浸之七日空腹溫服三合日二服漸漸加

之以知為度酒盡旋旋添之無所忌

又療久患氣脹為牛尿方 取烏牛尿空心溫服一小升日一服氣散則止無所忌 並出第

通按書鳴
酒濁寄言
氣聲有聲

近效燒鹽通一切氣尤療風方 取鹽花以生麻油和之以濕布一片急裹以繩子繫如打膻鍾許大置

瓦子上以炭火四面燒望之如火氣訖更勿加炭待火盡冷訖吹扇去灰收取鹽搗破如患心腹脹滿

氣隔不通取甚子大合噉之立差如雀訶梨勒檳榔及茶湯用此鹽療一切病韓建用

又訶梨勒丸療氣脹不下食尤除惡氣方 訶梨勒 青木香 石二味等分搗篩融沙糖和衆手一時

捻為丸隨意服之氣甚者每服八十九日再稍輕者每服四五十丸則得性熱者以生牛乳下性冷者

以酒下不問食之前後得云自服大效

灸諸脹滿及結氣法二十二首

千金療臌脹脅腹滿法 灸膈俞百壯三報穴在第七椎下兩傍各一寸半同翼

又療脹滿水腫法 灸脾俞隨年壯穴在第十一椎下兩傍各一寸半同翼

又療脹滿雷鳴酒沸法 灸大腸俞百壯三報穴在第十六椎下兩傍各一寸半同翼

又療脹滿氣聚寒冷法 灸胃管穴在心鳩尾下三寸灸百壯三報之同翼

又療脹滿繞臍結痛堅不能食法 灸中管百壯穴在臍上一寸一名水分同翼

又療脹滿瘕聚帶下疼痛法 灸氣海百壯穴在臍下一寸半忌不可針同翼

又療脹滿結氣如水腫狀小腹堅如石法 灸膀胱募百壯穴在中樞臍下四寸同翼

又療脹滿腎冷瘕聚泄痢法 灸天樞百壯通按婦人經天樞二

又療冷脹胸滿心腹積聚瘕疼痛法 灸肝俞百壯穴在第九椎下兩傍各一寸半同翼

又療五藏六腑積聚脹滿羸瘦不能飲食法 灸三焦俞隨年壯穴在第十三椎下兩傍各一寸半同翼

又療結氣法 扁鵲曰第四椎下兩傍各一寸半名關俞主胸中膈氣灸隨年壯通按關當作厥四椎兩

又主心腹諸病堅滿煩痛憂思結氣寒冷霍亂心痛吐下食不消腸鳴泄痢法 灸太倉穴一名胃募在

卷十六

針灸必用 灸諸脹滿及結氣法二十二首

心下四十胃管下一寸灸百壯

胸脅痛及妨悶方四首

又主結氣囊裏針藥所不及法 灸當募二穴在從乳頭邪度至臍中屋去半從乳下行度頭是灸隨年

壯通按胸人胸穴法量度乃得日月膺募之穴或主

又凡臍下絞痛流入陰中發作無時此冷氣瘵之法 灸臍下三寸名關元百壯

又瘵短氣不語法 灸肘後兩筋間名天井百壯

又方 灸大椎隨年壯

又方 灸肺俞穴在第三椎兩傍各一寸半百壯

又方 灸肝俞第九椎百壯

又方 灸尺澤百壯

又方 灸手十指頭各十壯

又方 灸小指第四指間交脉上七壯

又少年房室多短氣者法 灸鵠尾頭五十壯正出第十卷中

胸脅痛及妨悶方四首

病源胸脅痛者由膽與肝及腎之支脉虛為寒氣所乘故也足少陽膽之經也其支脉從目銳眥貫目下行至胸循脅裏足厥陰肝之經也其支脉起足大指聚毛上循入腹貫膈布脅肋足少陰腎之經也其支脉起肺出絡心注胸中此三經之支脉並循行胸脅邪氣乘於胸脅故傷其經脉邪氣之與正氣交擊故今胸脅相引而急痛也診其寸口脉弦而滑弦則為痛滑則為實痛則為急實則為蹶弦滑相搏則胸脅搶息痛也

又卒苦煩滿又胸脅痛欲死候此由手少陽之絡脉虛為風邪所乘故也手少陽之脉起小指次指之端上循入缺盆布膺中散絡心包風邪在其經邪氣迫於心絡心氣不得宣暢故煩滿乍上攻於胸或下引

於腎故煩滿而又胸脅痛也若經久邪氣留連搏於藏則成積搏於腑則成聚也

廣濟療氣結等心胸脅間痛不能喫食訶梨勒散方 訶梨勒四顆地人參二右二味搗篩為散以牛

乳二升煮三四沸頓服之分為二服亦得如人行二里進一服無所忌

又療胸背不利腹中脹氣急妨悶半夏湯方 半夏洗生薑片桂心六橘榔二右四味切以水

八升煮取二升四合絞去滓分溫五服服別相去如人行六七里進一服快利為度忌羊肉鵠生蔥油

臍小品有吳茱萸三十顆無橘榔餘並同

又療胸脅妨悶胃中客氣大便苦難大黃丸方 大黃計厚朴炙枳實炙芒硝八杏仁六葶藶

子細右六味搗篩蜜和丸空腹以飲服如梧子十九日二服稍稍加以大便微調為度忌生冷油

臍粘食中

千金療冷氣脅下往來胸脇痛引脅背悶當歸湯方 當歸 芍藥 吳茱萸 桂心 人參 大黃

甘草各二茯苓 枳實各一乾薑三右十味切以水八升煮取二升半一服八合日三服治尸注

亦佳忌海藻松菜生葱酢物等第十卷中

脅肋痛方二首

小品療脅下偏痛發熱其脈緊弦此寒也當以溫藥下之大黃附子湯方 大黃三附子三細辛二

右三味切以水五升煮取二升分三服若強盛人煮取三升半分為三服服別如人行四五里進一服

忌猪肉冷水生菜等仲景

大半夏茯苓湯療胸脇心腹中痰水冷氣心下汪洋嘈煩或水鳴多唾口清水自出脅肋急脹痛不欲食

此皆胃氣弱受冷故也其脈喜沉弦細遲悉主之方 半夏洗生薑各五茯苓三旋復花一陳橘皮 人

參 桔梗 芍藥 甘草各二桂心 右十味切以水九升煮取三升分三服欲得利者加大黃須微調者用乾地黄病有先時煮水下者加白朮三兩除旋復花若大便不調宜加大黃及乾地黄並用

外要略三
二升

三兩忘羊肉餛酢物生葱豬肉海藻菰菜第一卷中

胸膈氣方三首

廣濟療胸膈氣脹滿噎食心下妨虛熱脚手煩疼漸羸瘦不能食四肢無力枳實丸方 枳實六 犀角

前胡 胡 四青木香 麥門冬 赤茯苓 八苦參 芍藥 六 右八味搗篩為末蜜和丸如梧子以

飲室腹下二十九丸漸加至三十九丸二服不利忘生菜熱茹油膩炙肉酢蒜

又療胸膈滿塞心背撮痛走注氣悶宜服此柴胡湯方 柴胡 當歸 青木香 犀角六兩 檳榔十 甘

草二 分 右六味切以水七升煮取二升半絞去滓內麝香末分溫三服如人行四五里微利為度忌

海藻菰菜生菜茹蕎麥猪魚蒜

又療胸膈間伏氣不下食臍下滿柴胡湯方 柴胡 枳實 生薑 白木各三 甘草各一 檳榔一 石

六味切以水六升煮取二升絞去滓分溫二服服別如人行六七里進一服小弱人微利禁生冷蒜脰

海藻菰菜桃李雀肉等並出第一卷中

寒症腹滿方一十三首

病源症者痛也此由陰氣積於內寒氣結搏而不散臍藏虛弱風冷邪氣相擊則腹痛裏急故云寒症腹

痛也出第二卷中

廣濟療丈夫虛勞寒症腹痛并主產後方 生乾地黄三 甘草二 茯苓 人參 當歸各二 大棗十四 白

羊肉三斤 右七味切以水三斗先煮羊肉取一斗去羊肉內諸藥煮取五升內葱白一把握取四升

絞去滓分溫五服服別相去如人行十二三里後藥消進少食食消服藥忌薑蔥海藻菰菜酢物餘無

忌出第四卷中 仲景傷寒論寒症連臍苦痛若發則白汗出手足厥寒若脉沉弦者二物大烏頭煎主之方 大烏頭五

林白蜜二斤 石藥以水三升煮烏頭取二斗去烏頭內蜜煎令水氣盡得二升強人服七合弱人五合

尚德按白
要略作自
又按要略
烏頭大者

尚德按今
有方一十
二首

五枝以水
三升煮取
一升去滓
內蜜二升
云云
尚德桂要
略用下所
出五味桂
枝湯下用
桂汁
又按要略
甘草二兩
外參義脫
兩字
尚德桂要
以用水八
升

一服不差明日更服日止一服不可再也忌豬肉冷水

又寒疝腹滿逆冷手足不仁若一身盡痛灸刺諸藥所不能治者抵當烏頭桂枝湯主之方 秋烏頭

一枚白蜜一斤桂心四兩 右三味先以蜜微火煎烏頭減半去烏頭別一處以水二升半煮桂取一

升去滓以桂汁和前蜜合煎之得一分許初服二合不知更服至三合又不復知更加至五合其知如

醉狀得吐者為中病也忌豬肉冷水生葱等 花同

又方 桂心 芍藥各三兩甘草二兩大棗十二枚 右五味切以水七升煮取三升去滓取五合和

前烏頭蜜令得一升餘並同前法服 仲景傷寒 論千金同 右五味切以水七升煮取三升去滓取五合和

又療寒疝腹中痛引脅痛及腹裏急者當歸生薑羊肉湯主之方 當歸兩生薑兩肥羊肉一斤 右三

味切以水一斗合煮取三升去滓溫服七合日三痛即當止若寒多者加生薑足前成一斤若痛多而

嘔者加橘皮二兩木一兩合前物煮取三升加生薑者亦加水五升煮取三升二合服之依前 范汪錄

又療寒疝腹中痛者柴胡桂枝湯方 柴胡四兩大棗六黃芩 人參各一兩甘草一兩半夏二合桂心 生

薑 芍藥各半 右九味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服又云人參湯作如桂枝法加半

夏柴胡黃芩復如柴胡湯法今著人參作半劑忌海藻菘菜羊肉錫生蔥 並出第十 卷中 芍藥略三羊肉三

小品寒疝氣腹中虛痛及諸脅痛裏急當歸生薑等四味主之方 當歸 生薑 芍藥 羊肉三

右藥切以水一斗二升煮肉爛熟出肉內諸藥煎取三升分溫服七合日三數有效 范汪同出第一卷

中

集驗療寒疝氣來往衝心腹痛桂心湯方 桂心四兩生薑兩三吳茱萸兩 右三味切以酒一大升煎至三

合去滓分溫三服如人行六七里一服忌生蔥

又療寒疝下牽少腹痛附子丸方 附子炮二兩 桃仁二兩去炭麥子一升去 角尖熱 右三味搗篩末蜜和丸梧

又療積年腹內宿結疝冷氣及諸癰癥等香豉丸方 香美爛豉暴乾微熬令香即止 小芥子去土石

微熬令赤即止略一 右二味搗篩蜜和丸梧子大空腹酒服二十丸漸加至三十九日二服初服半

劑以來腹中微絞痛勿怪之是此藥攻病之候 又療疰瘕冷氣方 採鼠李子日乾九蒸九暴酒浸服三合日二服漸加至三服能下血及碎肉積滯物

古今錄驗楚王瓜子丸療心腹寒疝胸脅支滿食飲不化寒中腹痛及嘔痢風痙頸項強急不得俛仰方 桂心五兩 黃芩五兩 白薇五兩 乾薑五兩 烏頭二分 蜀椒五分 芎藭四分 防葵二分 白芷二分 右九味末之合蜜和為

丸如梧子先食服一丸日三不知稍稍增之以腹中溫身中懷懷為度忘生葱猪肉冷水方中無名

寒痼心痛方三首

病源夫疰者痛也陰氣積結所生也陰氣不散則寒氣盛寒氣盛則痛上下無常處冷氣上衝於心故令心痛也出第二卷中

范汪大茱萸丸療心腹寒疝胸中有逆氣時上搶心痛煩滿不得臥而目惡風悸掉惕惕時驚不欲飲食而嘔變發寒熱方 吳茱萸半斤 細辛 芍藥 柴胡前胡 旋復花 黃芩 紫苑 人參 白朮 茯苓 乾薑 桂心 附子也 甘草炙 半夏洗 當歸兩半 右十六味搗篩以蜜和為丸如梧子先食服

三丸日三不知稍加忘生蔥羊肉錫酢物桃李雀肉豬肉生菜海藻菰菜除此更無所忌無桂心又

小品解急蜀椒湯主寒痼氣心痛如刺繞臍腹中盡痛白汗出欲絕方 蜀椒二升 附子一枚 粳米半升 乾

薑半升 半夏洗 大棗枚 甘草炙 兩 右七味切以水七升煮取三升澄清熱服一升不差更服一升數用療心腹痛困急欲死解結逐寒上下痛良忘緒羊肉錫海藻菰菜同經心錄 同出第一卷中

古今錄驗療心痛寒症牡丹丸方 牡丹_{心桂心}各二烏頭_桂二 右三味末之合蜜和為丸如大豆旦

起未食服三九日二不知稍增之藥少急寧少服并治通尸發動無烏頭附子亦可用炮之忌胡荽豬

肉冷水生蔥等

出第八卷中

辛疝方三首

集驗療卒疝暴痛方

灸大敦男左女右三壯立已穴在灸經圖上

出第六卷中

文仲療卒得諸疝少腹及陰中相引絞痛白汗出欲死方

搗沙參下篩酒服方寸匕立愈

肝候備急同

人若不差服諸利丸下之走馬湯亦佳此名寒疝亦名陰疝張仲景飛尸走馬湯方

巴豆_{心皮}二枚去杏仁

一枚去

右二味取綿纏提令極碎投熱湯二合捻取白汁服之須臾差未差更一服老小量之通療

鬼擊有尸疹者常蓄此藥用驗忌野猪肉蘆笋

備急同出第十卷中

七疝方三首

病源七疝候七疝者厥疝癰疝寒疝氣疝盤疝附疝狼疝也厥逆心痛足寒諸飲食吐不下名曰厥疝也

腹中氣乍滿心下盡痛氣積如臂名曰癰疝也寒飲食則脅下腹中盡痛名曰寒疝也腹中乍滿乍減而

痛名曰氣疝也腹中痛在臍傍名曰盤疝也腹中臍下有積聚名曰附疝也少腹與陰相引而痛大便難

名曰狼疝也凡七疝皆由氣血虛弱飲食寒溫不調之所生也

出第二卷中

文仲小器七疝丸主暴心腹厥逆不得氣息痛達背脊名曰尸疝心下堅痛不可手迫名曰石疝臍下堅

痛得寒冷食輒劇名曰寒疝脅下堅痛大如手痛時出見若不痛不見名曰盤疝臍下結痛女人月事不

時名曰血疝少腹脹滿引膀胱急痛名曰脉疝悉主之方

臣等謹撰

椒四分桔梗

芍藥 乾薑

厚朴吳細辛

附子_{地各為頭也}一分

右八味末之蜜和丸服如大豆三九加至七八九日三服忌猪

肉冷水生菜

出第一卷中

古今錄驗七疝丸療疝諸寒臍傍痛上支胸中滿少氣大醫垂獎之方

蜀椒_{五分}

乾薑

厚朴_{吳黃芩}

尚德按此
主治正六
疝疑脫一

細辛 芍藥 桂心絡四 桔梗 仁烏 喉地 柴胡 茯苓 牡丹皮各一 右十二味 搗篩蜜和丸 梧子

大先舖以酒服七丸 日三 不知漸加 以知為度 忌豬肉冷水生蔥生菜酢物 胡椒 薑 芩 附子 同出

集驗症 氣桃仁湯方 桃仁去皮 吳茱萸 橘皮 海藻各三 生薑 茯苓 羌活 荻藜子去角各

右八味 切以水三大升 煮取九合 分為三服 空心服 忌酢物

寒症不能食方四首

深師療虛冷心腹寒症 胸脇支滿 飲食不消 腹中痛 久痢 頸強 芎藭丸方 芎藭 烏頭四分 防葵二

椒九分 白薇 仁桂心 針白芷 鉅菜 莢乾薑 右九味 搗篩蜜和丸 如梧子 飲服二丸 日三 稍加至

五六丸 以知為度 忌豬肉冷水生蔥乾薑

又王虛冷瘕癖症 食不消 心腹痛 氣弱 不欲食 虛腹脹 吳茱萸丸方 吳茱萸 針紫苑 白薇各三

頭分 桂心 針前胡 芍藥 細辛 芎藭 黃芩各五 右十味 下篩蜜和酒服 如梧子 五丸 日三

稍加之 忌豬肉冷水 桃李生 蔥生菜等此方元氣五味經忘法有此方即當用白

范汪療手足熱腹中寒症 不能食 飲數心腹痛 十一物七熱飯後丸方 茯苓 乾薑各六 附子三 右藥 乾薑

柴胡 針芎藭 針蜀椒針 芒硝一分 杏仁一分 五苓 應子 升加 桂心兩 附子三 右藥 乾薑

茯苓 不熱餘皆熱 搗篩以蜜和丸 如梧子 飲服七丸 日三 龍朔元年三月十七日 詔書十一物七熱方

忌豬肉冷水 醋物生蔥等此方元氣五味經忘法有此方即當用白

集驗療寒症不能食方 取馬蘭子一升 每日取胡桃許以麴拌熟煮吞之 然後依常飯日再服 服盡必

愈 亦除腹內一切諸疾 消食肥肌 仍時燒埽熱以殺羊毛作氈裏却氈上慰之日一度 尤佳

寒症積聚方四首

病源夫積聚者由寒氣在內所生也 血氣虛弱 風邪搏於臍藏 寒多則氣澀 氣澀則生積聚也 積者陰氣

五藏所生 始發不離其部 故上下有所窮 已聚者 湯氣六腑所成也 故無根本 上下無所留止 但諸藏將

尚德樓駢音
良馬又與
快通駢音
史疾也今
注云所吏
反則本文
駢疑當作
駢通云脉
駢為駢脉
通為駢來
審何據

受邪初未能為積聚邪氣留滯不去乃成積聚其為病也或左右脇下如覆杯或臍上下如臂或胃管悶覆大如盤羸瘦少氣或洒淅寒熱四肢不收飲食不為肌膚或累累如桃李或腹滿嘔泄寒則痛故云寒疝積聚也其脉弦反更而緊積聚浮而牢積聚牢強急者生虛弱急者死此第二十卷中通按脈數為積脈遲為疝深師破積丸瘳寒疝久積聚周走動搖大者如盞小者如杯乍來乍去在於胃管大腸脹滿不通風寒則腸鳴心下寒氣上搶胸脇支滿芫花丸方 芫花 蜀椒汗各一分 大黃 細辛各六分 桔梗五兩 瓜頭四分 茱萸

病

愈忌猪羊肉饴酢物生菜等

又當歸九療心腹勞強寒疝邪

利流飲在腹中食不生肌方

人參 沙參 各三分 特生磐石

冷水

古今錄驗療久寒三十歲心腹

支滿不嗜食手足悞煩月水不

胡一云柴胡乾薑
烏頭十炮

桂心各十 右十五味搗篩

肉冷水桃李雀肉燕蕒等

集驗療腎冷及疼疝氣滯後灌

灌之即止

心症方四首

病源心疝者由陰氣積於內寒氣不散上衝於心故使心痛謂之心疝也其痛也或如錐刀所刺或四肢

外臺祕要

卷七

心經方四首

十四

逆冷或唇口變青皆其候也

出第二
十卷中

范汪療心疝復繞臍痛上支脅心下痛方

芍藥

桔梗

細辛

蜀椒

桂心

乾薑

附子

一分

右七味末之合蜜和為丸如梧子服七丸以酒下日二服忌豬肉冷水生葱生菜等

大療三十年心疝神方

真射干

新好菜萸

右二味

等分搗篩蜜和丸服如麻子二九日三

藥勢盡乃熱食良已用得差

劉國英

又主心疝方

灸兩足大指甲寅之際甲寅各半炷隨年壯良


通按寅
當作寅

又心疝發時心腹痛欲死方

灸足心及足大指甲後橫理節上及大指歧間白黑肉際百壯則止足心

者在足下偏近大指本節際不當足心中央也

並出第十八卷中
通按足心在
足下近大指本節即湧泉穴也



67
W24.11 w
1915
V. 5-7